

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фосфоглив® форте
капсулы, 65 мг + 300 мг

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « ____ » 160419 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное или группировочное наименование: Фосфолипиды+Глицирризиновая кислота Описание: капсулы твердые желатиновые №0; корпус и крышка капсулы - коричневого цвета. Содержимое капсулы – масляная пастообразная масса от светло-желтого до оранжево-коричневого цвета со слабым специфическим запахом. Состав на одну капсулу: Фосфолипиды (Липоид ППЛ-400) - 400,0 мг [в пересчете на 100 % вещество (основной компонент - фосфатидилхолин 73-79 %)] – 300,0 мг Натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты) – 65,0 мг	Международное непатентованное или группировочное наименование: Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды Описание: капсулы твердые желатиновые № 0; корпус и крышечка капсулы - коричневого цвета. Содержимое капсул – масляная пастообразная масса от светло-желтого до оранжево-коричневого цвета со слабым характерным запахом. Состав на одну капсулу: <i>Действующие вещества:</i> Фосфолипиды (Липоид ППЛ-400) – 400,0 мг [в пересчете на 100 % вещество (основной компонент - фосфатидилхолин от 73 до 79 %)] – 300,0 мг. Натрия глицирризинат (тринатриевая соль

Старая редакция	Новая редакция
<u>Вспомогательные вещества:</u> бутилгидрокситолуол – 0,1 мг, спирт этиловый сорт «люкс» или «экстра» (этанол) – 12 мг, масло подсолнечное или масло кукурузное – 22,9 мг <u>Состав оболочки капсулы</u> Капсулы твердые желатиновые № 0 <i>Корпус и крышка:</i> титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид черный, краситель железа оксид желтый, желатин.	глицирризиновой кислоты) – 65,0 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> бутилгидрокситолуол – 0,1 мг, этанол (спирт этиловый) 95 % – 12,0 мг, подсолнечное масло – 22,9 мг Капсулы твердые желатиновые № 0 – 96,0 мг. [Состав капсулы: <i>корпус и крышечка:</i> титана диоксид (Е 171) – 0,3333 %, краситель железа оксид красный (Е 172) – 0,9300 %, краситель железа оксид желтый (Е 172) – 0,2000 %, краситель железа оксид черный (Е 172) – 0,5300 %, желатин – до 100,0 %].
Противопоказания Антифосфолипидный синдром; применение у пациентов с известной непереносимостью кукурузы или продуктов из кукурузы (препарат в составе вспомогательных веществ может содержать кукурузное масло); повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 12 лет.	Противопоказания Антифосфолипидный синдром; повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 12 лет.
Форма выпуска. Капсулы, 300 мг + 65 мг. По 30, 50, 100, 200 или 300 капсул в пластиковые контейнеры с крышками из полиэтилена высокого давления или банки полимерные, укупоренные крышками с контролем вскрытия с влагопоглощающей вставкой.	Форма выпуска Капсулы, 65 мг + 300 мг. По 30, 50, 100, 200 или 300 капсул в пластиковые контейнеры с крышками из полиэтилена высокого давления. По 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

Старая редакция	Новая редакция
По 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 1 контейнер или банку, или 2, 3, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	1 контейнер или 2, 3, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"



Е.В. Толстова