



ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Аксетин®

(торговое наименование препарата)

порошок для приготовления раствора

для внутривенного и внутримышечного введения, 1,5 г

(лекарственная форма, дозировка)

Медокеми Лтд., Кипр

(производитель, страна)

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ____ » **190321** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска: Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,5 г. По 1,5 г цефуроксима во флаконы бесцветного стекла типа I, укупоренные резиновыми пробками закатанные алюминиевыми колпачками. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению картонную пачку. По 100 флаконов (для стационаров) вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,5 г. По 1,5 г цефуроксима во флакон бесцветного стекла типа I, укупоренный резиновой пробкой закатанной алюминиевым колпачкам. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку из картона. <i>Для стационаров</i> По 100 флаконов с равным количеством инструкцией по применению в пачку из картона.

Руководитель отдела по
развитию бизнеса
ООО «МДА»



Вильчинская М.Ю.

