

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Эхинацея-ГаленоФарм, настойка

Регистрационный номер: P N000167/01-170408

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Срок введения изменений с « 27 » 04 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска: По 50, 100 мл во флаконы темного стекла, по 100 мл в банки темного стекла, помещенные вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Особые указания: У больных с хроническими заболеваниями печени и пациентов, страдающих алкоголизмом и получающих курс лечения, следует помнить, что препарат содержит 40 об. % алкоголя. Количество принимаемого за один раз алкоголя соответствует приему примерно одной столовой ложки вина. В случае длительного хранения	Форма выпуска: По 25, 50, 100 мл во флаконы темного стекла, по 100 мл в банки темного стекла, помещенные вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Особые указания: Больным с хроническими заболеваниями печени и пациентам, страдающим алкоголизмом и получающим курс лечения, следует помнить, что препарат содержит 40 об. % алкоголя. Количество принимаемого за один раз алкоголя соответствует приему примерно одной столовой ложки вина. В случае длительного хранения

Старая редакция	Новая редакция
раствор может стать мутным, появляется осадок, состоящий из активных полисахаридов (перед употреблением флакон необходимо несколько раз встряхнуть). Помутнение и хлопьевидные образования раствора не влияют на эффективность.	раствор может стать мутным, появляется осадок, состоящий из активных полисахаридов (перед употреблением флакон необходимо несколько раз встряхнуть). Помутнение и хлопьевидные образования раствора не влияют на эффективность.

Генеральный директор
ОАО «Фармацевтическая
фабрика Санкт-Петербурга»



Т.А. Балаев