

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Регастим Гастро

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления геля для приёма внутрь

лекарственная форма, дозировка

Акционерное общество «Медико-биологический
научно-производственный комплекс «Цитомед», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы: Внутрь. Препарат принимают внутрь в виде геля 2 раза в сутки натощак (утром за 20 - 30 минут до приёма пищи и вечером перед сном, не ранее чем через час после приема пищи). Перед применением разовую дозу – 3 г порошка (1 чайную ложку) перемешать около 3-5 минут в 50 мл (1/4 стакана) горячей, но не кипящей воде до получения геля однородной консистенции. Гель готовят непосредственно перед применением. Для удобства перемешивания	Способ применения и дозы: Внутрь. Препарат принимают внутрь в виде геля 2 раза в сутки натощак (утром за 20 - 30 минут до приёма пищи и вечером перед сном, не ранее чем через час после приема пищи). Перед применением разовую дозу – 3 г порошка (1 чайную ложку или 1 пакетик) перемешать около 3-5 минут в 50 мл (1/4 стакана) горячей, но не кипящей воде до получения геля однородной консистенции. Гель готовят непосредственно перед применением. Для удобства

Старая редакция	Новая редакция
рекомендуется добавлять воду в порошок, а не наоборот. Курс лечения 28 дней. При атрофическом гастрите, ассоциированном с <i>Helicobacter pylori</i>, препарат применять после курса эрадикационной терапии. При положительной динамике лечения по назначению врача возможно проведение повторного курса через 2 недели.	перемешивания рекомендуется добавлять воду в порошок, а не наоборот. Курс лечения 28 дней. При атрофическом гастрите, ассоциированном с <i>Helicobacter pylori</i>, препарат применять после курса эрадикационной терапии. При положительной динамике лечения по назначению врача возможно проведение повторного курса через 2 недели.
Форма выпуска: Порошок для приготовления геля для приема внутрь. По 90 г в банке полимерной из полиэтилена, укупоренной пластмассовой крышкой из полиэтилена с контролем первого вскрытия или крышкой из полипропилена с контролем первого вскрытия с защитой от детей. На банку наклеивают этикетку самоклеящуюся. По одной банке с инструкцией по применению в пачке из картона	Форма выпуска: Порошок для приготовления геля для приема внутрь. По 90 г в банке из полиэтилена, укупоренной крышкой из полиэтилена с контролем первого вскрытия или крышкой из полиэтилена или пропиленом с контролем первого вскрытия и защитой от детей. На банку наклеивают этикетку самоклеящуюся. По одной банке с инструкцией по применению в пачке из картона. По 3 г в пакетик из комбинированного материала. По 14 или 28, или 56

Старая редакция	Новая редакция
	пакетиков в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

Генеральный директор
АО «МБНПК «Цитомед»



А.Н. Хромов