**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Канизон® Плюс**

**крем для наружного применения**

Аджио Фармацевтикалз Лтд., Индия

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-003154/09-200717
СОГЛАСОВАНО

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» _____20___г 200717

| *Старая редакция* | *Новая редакция* |
|---|---|
| **Показания к применению**<br>Простые и аллергические дерматиты (осложненные вторичным инфицированием), атопический дерматит (в т.ч. диффузный нейродермит), ограниченный нейродермит, экзема, дерматомикозы (дерматофитии, кандидоз, разноцветный лишай), особенно при локализации в паховой области и крупных складках кожи; простой хронический лишай, ограниченный нейродермит. | **Показания к применению**<br>Простые и аллергические дерматиты (осложненные вторичным инфицированием), атопический дерматит (в т.ч. диффузный нейродермит), ограниченный нейродермит, экзема, дерматомикозы (дерматофитии, кандидоз, разноцветный лишай), особенно при локализации в паховой области и крупных складках кожи; простой хронический лишай. |
| **С осторожностью**<br>Беременность (I триместр), детский возраст до 2 лет, длительное лечение, применение на больших участках кожи или при нарушении | **С осторожностью**<br>Длительное лечение, применение на больших участках кожи или при нарушении целостности кожных покровов, использование окклюзион- |

| | |
|---|---|
| целостности кожных покровов, использование окклюзионных повязок (особенно у детей). | ных повязок (особенно у детей). |
| **Применение во время беременности и в период кормления грудью**<br>Не рекомендуется применение препарата в 1 триместре беременности.<br>При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение клотримазола в период беременности оказывает отрицательное влияние на здоровье женщины и плода. Однако вопрос о целесообразности назначения препарата во II и III триместрах беременности должен решаться индивидуально после консультации врача. Возможность экскреции клотримазола с материнским молоком не изучалась. Поэтому Канизон® Плюс, крем для наружного применения следует использовать у кормящих матерей с осторожностью. | **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**<br>Не рекомендуется применение препарата в 1 триместре беременности.<br>При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение клотримазола в период беременности оказывает отрицательное влияние на здоровье женщины и плода. Однако вопрос о целесообразности назначения препарата во II и III триместрах беременности должен решаться индивидуально после консультации врача.<br>Возможность экскреции клотримазола с материнским молоком не изучалась. Поэтому Канизон® Плюс, крем для наружного применения следует использовать у кормящих матерей с осторожностью. |
| **Форма выпуска**<br>Крем для наружного применения. | **Форма выпуска**<br>Крем для наружного применения. |

| | |
|---|---|
| По 15 г препарата в алюминиевой тубе. По 1 тубе с инструкцией по применению в картонной пачке. | По 15 г или 30 г препарата в алюминиевой тубе. По 1 тубе с инструкцией по применению в картонной пачке. |

С уважением,

Уполномоченный Представитель
Аджио Фармацевтикалз Лтд.




Г. Руя