МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003592- 101121
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕНОГО ПРЕПАРАТА

Долонит®-МосФарма

торговое наименование лекарственного препарата

гель для наружного применения

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения изменения «_____»_____20___ г. 101121

Старая редакция	Новая редакция
Фармакокинетика *Гепарин* при наружном применении всасывается незначительно. *Декспантенол* при наружном применении превращается в пантотеновую кислоту, входящую в состав коэнзима А, который играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления. Физиологическая концентрация *димелсульфоксида* в норме в плазме крови составляет 40 нг/мл. Срустя 6 часов после нанесения препарата максимальная концентрация в плазме крови достигает 120 нг/мл и сохраняется до 12 часов после применения. 12-25% абсорбированного ДМСО выводится в течение первых 24 часов и 37-48% выводится в течение 7 дней в неизмененном виде через почки или в виде метаболита (диметилсульфона). 3,5-	***Фармакокинетика*** *Гепарин* при наружном применении всасывается незначительно. *Декспантенол* при наружном применении превращается в пантотеновую кислоту, входящую в состав коэнзима А, который играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления. Физиологическая концентрация *димелсульфоксида* в норме в плазме крови составляет 40 нг/мл. **Спустя** 6 часов после нанесения препарата максимальная концентрация в плазме крови достигает 120 нг/мл и сохраняется до 12 часов после применения. 12-25% абсорбированного ДМСО выводится в течение первых 24 часов и 37-48% выводится в течение 7 дней в неизмененном виде через почки или в виде метаболита (диметилсульфона). 3,5-

Старая редакция	Новая редакция
6% всего ДМСО выводится через легкие в виде диметилсульфита спустя 6-12 часов после применения препарата. Период полувыведения ДМСО составляет 11-14 часов.	6% всего ДМСО выводится через легкие в виде диметилсульфита спустя 6-12 часов после применения препарата. Период полувыведения ДМСО составляет 11-14 часов.
Особые указания	**Особые указания**
Перед применением геля необходимо тщательно очистить участок кожи от других лекарственных препаратов и загрязнений. Наложение повязок возможно только после проникновения большей части геля в кожу и испарения содержащегося в его составе спирта (через несколько минут).	Перед применением геля необходимо тщательно очистить участок кожи от других лекарственных препаратов и загрязнений. Наложение повязок возможно только после проникновения большей части геля в кожу и испарения содержащегося в его составе спирта (через несколько минут).
Препарат нельзя наносить на слизистые оболочки глаз, носа, рта, открытые раны или на поврежденную кожу (вследствие облучения, сильного солнечного ожога; послеоперационные рубцы).	Препарат нельзя наносить на слизистые оболочки глаз, носа, рта, открытые раны или на поврежденную кожу (вследствие облучения, сильного солнечного ожога; послеоперационные рубцы).
Во время лечения препаратом может усиливаться светочувствительность кожи, поэтому в период его применения следует ограничивать интенсивные солнечные ванны и посещение солярия. В случае возникновения кожных реакций лечение должно быть прекращено. Из-за высокой абсорбции ДМСО не следует использовать препарат в комбинации с другими мазями и гелями.	Во время лечения препаратом может усиливаться светочувствительность кожи, поэтому в период его применения следует ограничивать интенсивные солнечные ванны и посещение солярия. В случае возникновения кожных реакций лечение должно быть прекращено. Из-за высокой абсорбции ДМСО не следует использовать препарат в комбинации с другими мазями и гелями.
При самостоятельном применении препарата не следует превышать рекомендованные дозы и максимальные	При самостоятельном применении препарата не следует превышать рекомендованные дозы и максимальные

Старая редакция	Новая редакция
сроки применения препарата. В случае уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.	сроки применения препарата. В случае **отсутствия** уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.

Начальник отдела регистрации
ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика»



Н.А. Шишкин