

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ксимедон®

Регистрационный номер

ЛС-000045

Торговое наименование

Ксимедон®

Международное непатентованное или группировочное наименование

Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

1 таблетка содержит:

Действующее вещество: гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин – 250 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат.

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до светло-розового цвета или светло-розового с желтоватым оттенком цвета с вкраплениями более интенсивного оттенка, с фаской и риской с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа: Репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: V03A

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин ускоряет процессы регенерации тканей и сокращает сроки заживления ожоговой поверхности, улучшает приживление кожных трансплантатов при аутодермопластике. Способствует нормализации соотношения между содержанием фибриногена в крови и ее фибринолитической активностью, улучшает регионарное кровообращение. Нормализует иммунную систему, повышает фагоцитарную активность Т-лимфоцитов и неспецифическую резистентность организма. Стимулирует эритро- и лейкопоз, клеточные и гуморальные факторы защиты, оказывает противовоспалительное и антимикробное действие.

МИНЗДРАВ РОССИИ

24.11.22

СОГЛАСОВАНО

Фармакокинетика

При пероральном приеме гидроксипропилдиметилдигидропиримидина происходит быстрое всасывание его в течение 0,5-1 ч; максимальная концентрация препарата в сыворотке крови достигается через 1,7 ч. Период полувыведения препарата составляет 5,5 ч. В результате низкого процента связывания с сывороточным альбумином (9 %) и отсутствием биотрансформации в организме препарат не оказывает конкурентного действия при приеме других лекарственных средств.

Показания к применению

В комплексной терапии следующих заболеваний:

- глубокие и поверхностные ожоги (подготовка больных к аутодермопластике);
- длительно незаживающие раны;
- трофические язвы;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- пролежни;
- отморожения;
- гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и костей;
- хронический остеомиелит;
- стрептококковые инфекции (ангина, рожа);
- микробная экзема;
- псориаз;
- вирусные гепатиты;
- туберкулез легких;
- пневмония;
- хронический бронхит;
- хронический кистозный синусит;
- сальмонеллез;
- ревматизм;
- тромбозы глубоких вен нижних конечностей;
- до- и послеоперационные периоды для профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к гидроксипропилдиметилдигидропиримидину и другим компонентам препарата;

- лейкоз (острый и хронический);
- эритремия;
- детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом следует чаще определять толерантность к глюкозе, ввиду возможного уменьшения потребности в инсулине.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата показано только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В период лечения необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Применять внутрь до еды.

При глубоких и поверхностных ожогах (подготовке больных к аутодермопластике) - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 20 дней. При проведении кожно-пластических операций препарат назначают до и после операции по 10 дней.

При длительно незаживающих ранах, трофических язвах, пролежнях - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 25-30 дней.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - по 500 мг (2 таблетки) 2 раза в день курсом 12 дней.

При отморожениях - по 250 мг - 500 мг (1-2 таблетки) 3-4 раза в день в течение 2-5 недель.

При гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей и костей - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 10-30 дней.

При хроническом остеомиелите - до и после операции по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 20-25 суток. Повторные курсы лечения проводят через 6 месяцев на протяжении 1,5 лет.

При ангине, роже - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 7-10 дней.

При микробной экземе - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 10 дней.

При псориазе - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-3 недель.

При вирусных гепатитах В и С - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 10 дней.

При туберкулезе легких - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 2 месяцев.

При пневмонии и хроническом бронхите - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 18-21 дня.

При хроническом кистозном синусите - по 250 мг - 500 мг (1-2 таблетки) 4 раза в день в течение 1 месяца.

При сальмонеллезе - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 7 дней.

При ревматизме - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 3-4 недель.

В до- и послеоперационном периодах для профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 10-20 дней (с первого дня после операции или в дооперационный период 3-5 дней и далее с первого дня после операции).

Побочное действие

Возможны - диспепсия, аллергические реакции.

Передозировка

В связи с малой токсичностью и большой широтой терапевтического действия гидроксипиримидина случаев токсических проявлений не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Несовместимость Ксимедона с какими-либо лекарственными препаратами не выявлена.

Можно комбинировать с анаболическими стероидами, химическими и биологическими антисептиками.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки 250 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2, 5, 6 или 10 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Генеральный директор
АО "Татхимфармпрепараты"

Т.Ш. Ханнанов

