

ИНСТРУКЦИЯ

СОГЛАСОВАНО

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

БЕФУНГИН

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование: Бефунгин

Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для приема внутрь

Состав.

Для приготовления 1000 мл препарата необходимо:

Действующие вещества:

Чага измельченная - 1000 г

Кобальта хлорида гексагидрат - 1,75 г

Вспомогательные вещества:

Этанол (этиловый спирт) 95 % - 100 г

Вода очищенная - необходимое количество до получения 1000 мл препарата.

Описание: жидкость темно-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа: общетонизирующее средство

Код АТХ: [A13A]

Фармакологическое действие

Действие препарата определяется эффектом входящих в его состав биологически активных веществ (полисахаридов, гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот, микроэлементов, в т.ч. марганца и кобальта, стероидных и др. соединений). Регулирует метаболические процессы, повышает защитные силы организма; оказывает общеукрепляющее действие.

Показания к применению

В качестве симптоматического средства при хронических гастритах, дискинезиях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии, при язвенной болезни желудка и онкологических заболеваниях.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, совместное применение пенициллина, внутривенное введение декстрозы.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Способ применения и дозы

Внутрь, в виде раствора. Для приготовления раствора содержимое флакона взбалтывают, разводят 3 чайные ложки препарата в 150 мл теплой кипяченой воды. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 3-5 месяцев. При необходимости курс повторяют после 7-10-дневного перерыва.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном применении - диспепсия.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В период применения препарата противопоказано применение пенициллина, внутривенное введение декстрозы (из-за возможного антагонизма).

Особые указания

Содержание в препарате этанола (этилового спирта) 10 %. Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,135 г, в максимальной суточной дозе – 0,405 г. Необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При лечении препаратом показана молочно-растительная диета с исключением консервированных продуктов, острых приправ, животных жиров.

Форма выпуска

Концентрат для приготовления раствора для приема внутрь.

По 40, 50 или 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками навинчиваемыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73

Директор ООО «Тульская
фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович