

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Ордисс®

наименование лекарственного препарата

таблетки, 8 мг, 16 мг, 32 мг

лекарственная форма, дозировка

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль

наименование производителя, страна

Изменение № 1

13 05 19

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав В 1 таблетке содержится: <i>активное вещество</i> кандесартана цилексетил 8,0 мг/16,0 мг/32,0 мг; <i>вспомогательные вещества</i>: крахмал прежелатинизированный 3,75 мг/7,5 мг/15,0 мг; полоксамер 188 0,5 мг/1,0 мг/2,0 мг; повидон-К30 4,0 мг/8,0 мг/16,0 мг; краситель оксид железа красный (E172) 0,075 мг/0,15 мг/0,3 мг; кармеллоза кальция 1,65 мг/3,3 мг/6,6 мг; целлюлоза микрокристаллическая 17,5 мг/35,0 мг/70,0 мг; лактозы моногидрат 43,725 мг/87,45 мг/174,9 мг; магния стеарат 0,8 мг/1,6 мг/3,2 мг. Форма выпуска Таблетки 8 мг, 16 мг, 32 мг. По 10 таблеток в блистеры из ПВХ/АI/ОПА-ПВХ/ПВАХ/АI. 3 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке. По 5 таблеток в блистеры из ПВХ/АI/ОПА-	Состав В 1 таблетке содержится: <i>действующее вещество</i> кандесартана цилексетил 8,00 мг/16,00 мг/32,00 мг; <i>вспомогательные вещества</i>: крахмал прежелатинизированный 3,75 мг/7,50 мг/15,00 мг; полоксамер 188 0,50 мг/1,00 мг/2,00 мг; повидон-К30 4,00 мг/8,00 мг/16,00 мг; краситель оксид железа красный (E172) 0,075 мг/0,15 мг/0,30 мг; кармеллоза кальция 1,65 мг/3,30 мг/6,60 мг; целлюлоза микрокристаллическая 17,50 мг/35,00 мг/70,00 мг; лактозы моногидрат 43,725 мг/87,45 мг/174,90 мг; магния стеарат 0,80 мг/1,60 мг/3,20 мг. Форма выпуска Таблетки 8 мг, 16 мг, 32 мг <u>Для таблеток дозировки 8 мг.</u> По 10 таблеток в блистеры из ПВХ/АI/ОПА-ПВХ/ПВАХ/АI.

Старая редакция	Новая редакция
ПВХ/ПВАХ/А1. 6 блистеров с инструкцией по применению в картонной пачке.	3 или 6 блистеров с инструкцией по применению помещают в картонную пачку на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки. По 5 таблеток в блистеры из ПВХ/А1/ОПА-ПВХ/ПВАХ/А1. 6 блистеров с инструкцией по применению помещают в картонную пачку на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки. <u>Для таблеток дозировки 16 мг.</u> По 10 таблеток в блистеры из ПВХ/А1/ОПА-ПВХ/ПВАХ/А1. 3 или 6 или 9 блистеров с инструкцией по применению помещают в картонную пачку на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки. По 5 таблеток в блистеры из ПВХ/А1/ОПА-ПВХ/ПВАХ/А1. 6 блистеров с инструкцией по применению помещают в картонную пачку на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки. <u>Для таблеток дозировки 32 мг.</u> По 10 таблеток в блистеры из ПВХ/А1/ОПА-ПВХ/ПВАХ/А1. 3 блистера с инструкцией по применению помещают в картонную пачку на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки. По 5 таблеток в блистеры из ПВХ/А1/ОПА-ПВХ/ПВАХ/А1. 6 или 12 блистеров с инструкцией по

Старая редакция	Новая редакция
	применению помещают в картонную пачку на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.

Менеджер по регистрации



Крючкова И.Е.