

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 004491 - 101017

СОГЛАСОВАНО

КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ
(*Urticae folia*)

Регистрационный номер и дата:

Торговое наименование: Крапивы листья.

Группировочное наименование: Крапивы двудомной листья.

Лекарственная форма: Листья измельченные.

Состав: Крапивы листья.

Характеристика.

Крапивы листья содержат витамин К, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, хлорофилл, дубильные вещества, пантотеновую кислоту, флавоноиды, органические кислоты макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь кусочков листовых пластинок, черешков, редко - цветоносов, стеблей, отдельных цветков и семян, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм.

Цвет измельченного сырья от зеленого до темно-зеленого с серо-зелеными, белыми, желто-белыми и коричневыми включениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Гемостатическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой листьев крапивы оказывает кровоостанавливающее действие, повышает тонус матки.

Показания к применению.

Обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии, не обильные кровотечения в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату; гиперкоагуляция, кровотечения (при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства, опухолях); беременность; детский возраст до 12 лет.

С осторожностью.

При почечной недостаточности.

Применение в период грудного вскармливания.

Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Способ применения и дозы.

Около 5 г (1 столовая ложка) листьев крапивы помещают в эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при периодическом помешивании 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде взрослые и дети старше 12 лет по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции, гиперкоагуляция.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Листья измельченные.

По 50 г в пачку картонную с внутренним пакетом из бумаги или из бумаги и комбинированных материалов.

Полный текст инструкции наносится на пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ООО Фирма «Фито-Бот», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика,

Урупский р-он, ст. Преградная, ул. Подгорная, 62а

Тел./факс +7 (87876) 6-20-21.

Генеральный директор
ООО фирма «Фито-Бот»



Тихов В.И.