



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Флексид®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,

250 мг, 500 мг

лекарственная форма, дозировка

Лек д.д., Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « » **310820** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>действующее вещество:</i> левофлоксацин (в форме гемигидрата) 250 (256,23)/ 500 (512,46) мг соответственно; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат 13,27/26,54 мг, повидон 17,50/35,00 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 12,00/24,00 мг, тальк 9,00/18,00 мг, кремния диоксид коллоидный	Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>действующее вещество:</i> левофлоксацин (в форме гемигидрата) 250,000 (256,230)/ 500,000 (512,460) мг соответственно; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат 13,270/26,540 мг, повидон К30 17,500/35,000 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 12,000/24,000 мг, тальк 9,000/18,000

Старая редакция	Новая редакция
безводный 6,50/13,00 мг, кроскармеллоза натрия 4,50/9,0 мг, глицерил дибегенат 6,00/12,00 мг; <i>пленочная оболочка:</i> гипромеллоза 4,962/9,924 мг, гипролоза 1,238/2,476 мг, макрогол 6000 1,00/2,00 мг, железа оксид желтый 0,069/0,138 мг, железа оксид красный 0,069/0,138 мг, титана диоксид 2,162/4,324 мг, тальк 0,500/1,00 мг.	мг, кремния диоксид коллоидный безводный 6,500/13,000 мг, кроскармеллоза натрия 4,500/9,000 мг, глицерил дибегенат 6,000/12,000 мг; <i>пленочная оболочка:</i> гипромеллоза 4,962/9,924 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) 1,238/2,476 мг, макрогол 6000 1,000/2,000 мг, краситель железа оксид желтый 0,069/0,138 мг, краситель железа оксид красный 0,069/0,138 мг, титана диоксид 2,162/4,324 мг, тальк 0,500/1,000 мг.

Директор отдела регистрации и
клинических исследований
ЗАО «Сандоз»



Горожанин А.В.