

МИНЗДРАВ РОССИИ

03 09 24

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Метронидазол-ЭСКОМ

наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий, 5 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Открытое акционерное общество Научно-производственный
концерн «ЭСКОМ» (ОАО НПК «ЭСКОМ»), Россия

Общество с ограниченной ответственность Концерн «МИР»
(ООО Концерн «МИР»), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения изменения «__» 03 09 24 202__ г

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для инфузий, 5 мг/мл. По 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и 500 мл лекарственного препарата в стеклянные бутылки марки МТО для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, укупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. По 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата во флаконы полимерные (из полиэти-	Форма выпуска Раствор для инфузий, 5 мг/мл. По 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и 500 мл лекарственного препарата в стеклянные бутылки марки МТО для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, укупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. По 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата во флаконы полимерные (из полиэти-

Старая редакция	Новая редакция
лена высокого давления или полипропилена) запаянной горловиной с крышкой полимерной (из полиэтилена высокого давления или полипропилена) однопортовой или двухпортовой, или укупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. На бутылку стеклянную, флакон полимерный (из полиэтилена высокого давления или полипропилена) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку, или самоклеящуюся этикетку с петлей для подвешивания. По 1 бутылке стеклянной, флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку (пачка из коробочного картона). На пачку наносят информацию офсетным способом печати. По 1 флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в	лена высокого давления или полипропилена) с запаянной горловиной с крышкой полимерной (из полиэтилена высокого давления или полипропилена) однопортовой или двухпортовой, или укупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. На бутылку стеклянную, флакон полимерный (из полиэтилена высокого давления или полипропилена) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку, или самоклеящуюся этикетку с петлей для подвешивания. По 1 бутылке стеклянной, флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку (пачка из коробочного картона). На пачку наносят информацию офсетным способом печати. По 1 флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в

Старая редакция	Новая редакция
прозрачный полипропиленовый пакет или из полиэтилена высокого давления (вторичная (потребительская) упаковка). На пакет наклеивают самоклеящуюся этикетку. Бутылки стеклянные, полимерные флаконы совместимы с двусторонней канюлей для смешивания растворов. <i>Для стационаров.</i> По 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40 или 70 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 100, 150, 200, 250 мл лекарственного препарата; по 15, 24, 25, 30 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата с равным количеством инструкций по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку – коробку из гофрированного картона с/без решетками-«гнездами» из гофрированного картона.	прозрачный полипропиленовый пакет или из полиэтилена высокого давления (вторичная (потребительская) упаковка). На пакет наклеивают самоклеящуюся этикетку. Бутылки стеклянные, полимерные флаконы совместимы с двусторонней канюлей для смешивания растворов. <i>Для стационаров.</i> По 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40 или 70 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 100, 150, 200, 250 мл лекарственного препарата; по 15, 24, 25, 30 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата с равным количеством инструкций по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку – ящик из гофрированного картона с/без решетками-«гнездами» из картона.
Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии Общество с ограниченной ответственностью Химико фармацевтический концерн «МИР» (ООО ХФК «МИР»), Россия, 355035,	Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии Общество с ограниченной ответственностью Химико фармацевтический концерн «МИР» (ООО ХФК «МИР»), Россия, 355035,

Старая редакция	Новая редакция
Ставропольский край, г. Ставрополь, шоссе Старомарьевское, д. 9Г, помещ. 43. Тел.: +7(8652) 94-68-14, e-mail: MIR_026@bk.ru	Ставропольский край, г. Ставрополь, шоссе Старомарьевское, д. 9Г, помещ. 43. Тел.: +7(928) 306-11-45, e-mail: info@cph-mir.ru

Директор по
научно-техническому развитию
ООО ХФК «МИР»



Н.В. Гнусина