

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гидроперит

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Гидроперит

Международное непатентованное или группировочное наименование: Мочевины пероксид

Лекарственная форма: таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения

Состав

1 таблетка содержит:

Действующее вещество

Мочевины пероксид (гидроперит) 1,5 г

Описание: круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета со слегка заметными прозрачными вкраплениями с фаской.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX

Гидроперит относится к группе антисептических средств-окислителей и представляет собой комплексное соединение водорода пероксида с мочевиной. При взаимодействии гидроперита с такими ферментами организма, как каталаза и пероксидаза, выделяется кислород, проявляющий гемостатическое и антимикробное действие, поэтому после разведения препарат может применяться вместо готового раствора перекиси водорода.

Показания к применению

Гидроперит в виде водного раствора применяют для промываний и полосканий при стоматитах, тонзиллитах, гинекологических заболеваниях; при капиллярных кровотечениях из поверхностных ран, носовых кровотечениях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мочевины пероксиду.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Способ применения и дозы

Местно, наружно.

Гидроперит применяют в виде водного раствора.

Для полоскания полости рта и горла растворяют 1 таблетку в стакане воды (0,25 % раствор перекиси водорода). Для промывания растворяют 4 таблетки в стакане воды (1 % раствор перекиси водорода). Одна таблетка соответствует 15 мл 3 % раствора перекиси водорода. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тем способам применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по медицинскому применению.

Побочное действие

- Ощущение жжения в момент обработки раны.
- Аллергические реакции;
- Гипертрофия сосочков языка (при длительном применении для полоскания полости рта).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов, оксидантов, на свету, в тепле.

Если Вы применяете вышеперечисленные средства перед применением препарата Гидроперит, проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Антисептическое действие не является стерилизующим, происходит временное уменьшение количества микроорганизмов. Не следует применять окклюзионные повязки.

Нельзя использовать для орошения полостей, следует избегать попадания в глаза.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения, 1,5 г.

По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3, 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 20, 40, 50 таблеток помещают в банку полимерную из ПЭНД с крышечкой из ПЭНД с контролем первого вскрытия или без него. Одну банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

200, 300, 400, 600, 800 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.