

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МЯТНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Мятные таблетки

Лекарственная форма: таблетки сублингвальные

Состав на одну таблетку:

Активное вещество:

Мяты перечной листьев масло (мяты перечной масло) – 2,50 мг

Вспомогательные вещества:

Сахароза – 391,50 мг

Кремния диоксид коллоидный – 2,0 мг

Магния стеарат – 4,0 мг

Описание:

Круглые, плоские таблетки белого или почти белого цвета, допускается легкая мраморность, с запахом масла мяты перечной, с риской с одной стороны и фасками с двух сторон.

Фармакотерапевтическая группа: спазмолитическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: A03AX

Фармакологические свойства

Мяты перечной масло вызывает раздражение нервных окончаний слизистой оболочки полости рта, оказывает умеренное спазмолитическое, седативное и желчегонное действие.

Показания к применению

Применяют в качестве симптоматического средства при тошноте, рвоте, спастических болях органов желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Сахарный диабет, желчнокаменная болезнь.

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП 001961-171112

СОГЛАСОВАНО

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Применяют по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки. Таблетки держат во рту до полного рассасывания. Максимальная суточная доза – 8 таблеток. Курс лечения без консультации врача – 3 дня.

Побочное действие

Возможны: аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки полости рта.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Ослабляет действие гомеопатических лекарственных средств.

Особые указания

Для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 4,7 ХЕ, в максимальной суточной дозе содержится 37,6 ХЕ.

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Таблетки сублингвальные 2,5 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 или 100 таблеток в банки полимерные для лекарственных средств.

Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).

76260

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП 001901 - 211212

СОГЛАСОВАНО

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель:

ООО «Озон»

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д.11

Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензии):

445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 6.

Тел./факс: (84862) 3-41-09, 7-18-51.


E-mail: ozon_pharm@samtel.ru

www.ozonpharm.ru

Директор ООО «Атолл»



В. В. Брудневский



76260