

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Мятные таблетки

наименование лекарственного препарата

таблетки сублингвальные 2,5 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО «Озон», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 21 03 14 20 г

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: таблетки сублингвальные	Лекарственная форма: таблетки для рассасывания
Код АТХ: А03АХ	Код АТХ: А03
Побочное действие Возможны: аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки полости рта.	Побочное действие Возможны: аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки полости рта. При возникновении побочных реакций применение препарата следует прекратить.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Ослабляет действие гомеопатических лекарственных средств.	Взаимодействие с другими лекарственными средствами Ослабляет действие гомеопатических лекарственных средств.

Изменение № 1 к Инструкции С.2

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 4,7 ХЕ, в максимальной суточной дозе содержится 37,6 ХЕ. Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).	Особые указания Для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,03 ХЕ, в максимальной суточной дозе содержится 0,24 ХЕ. Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).
Форма выпуска Таблетки сублингвальные 2,5 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 или 100 таблеток в банки полимерные для лекарственных средств. Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).	Форма выпуска Таблетки для рассасывания 2,5 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 или 100 таблеток в банки полимерные для лекарственных средств. Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).

