

ИНСТРУКЦИЯ
 по медицинскому применению лекарственного препарата

Нафтизин плюс
 наименование лекарственного препарата
капли назальные 0,05 % и 0,1 %
 лекарственная форма, дозировка
ООО «Гротекс», Россия
 наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Нафтизин плюс	Санорин®
Торговое название: Нафтизин плюс	Торговое наименование: Санорин®
Международное непатентованное название: Нафазолин	Международное непатентованное наименование: Нафазолин
Состав препарата на 1 мл	Состав
<i>Активное вещество:</i> 0,05 % 0,1 %	Состав препарата на 1 мл
Нафазолина нитрат 0,5 мг 1,0 мг (нафтизин)	<i>Действующее вещество:</i> 0,05 % 0,1 %
<i>Вспомогательные вещества:</i>	Нафазолина нитрат 0,5 мг 1,0 мг
Борная кислота 20 мг	<i>Вспомогательные вещества:</i>
Морская вода 5 мг	Борная кислота 20 мг
0,1 М раствор натрия до рН 4,5 – 6,0 гидроксида	Морская вода 5 мг
Вода для инъекций до 1 мл	0,1 М раствор натрия гид- до рН 4,5 – 6,0 роксида
	Вода для инъекций до 1 мл

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Может оказывать резорбтивное действие. При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.	Особые указания Может оказывать резорбтивное действие. При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней. Морская вода, входящая в состав препарата, способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа за счет способности улучшать функцию мерцательного эпителия и нормализации выработки слизи в бокаловидных клетках слизистой оболочки.
Форма выпуска Капли назальные 0,05 % и 0,1 %. По 5, 10 или 15 мл во флакон с капельницей из полиэтилена низкой плотности и крышкой с контролем первого вскрытия или во флакон-капельницу из полиэтилена высокого давления в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей. По 1 флакону по 5, 10 или 15 мл или по 3 флакона по 5 мл вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.	Форма выпуска Капли назальные 0,05 % и 0,1 %. По 10 мл во флакон с капельницей из полиэтилена низкой плотности и крышкой с контролем первого вскрытия или во флакон-капельницу из полиэтилена высокого давления ФКП (флакон-капельница полимерная) в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.
Владелец регистрационного удостоверения ООО «Гротекс» Россия, 195279, Санкт-Петербург Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А Тел.: +7 812 385 47 87 Факс: +7 812 385 47 88	Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя АО «АЛСИ Фарма» Россия, 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58, этаж 8, помещ. XXV, ком. 16 Телефон: +7 (495) 787-70-55

Старая редакция	Новая редакция
Производитель/Организация, принимающая претензии ООО «Гротекс» Россия, 195279, Санкт-Петербург Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А Тел.: +7 812 385 47 87 Факс: +7 812 385 47 88 www.solopharm.com	Производитель ООО «Гротекс» Россия, 195279, г. Санкт-Петербург Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А

Заместитель директора по развитию

ООО «Гротекс»



С. В. Сергеев