ЛП-007192 от 11.04.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2024 № 6998
(Внешний МЭЭ №4366809)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НАФТИФИН

торговое наименование лекарственного препарата

Нафтифин

международное непатентованное, группировочное или химическое наименование

раствор для наружного применения, 1 %

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Самарамедпром», Россия
ООО «Технопарк-Центр», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование: НАФТИМАКС **Показания к применению** • грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea coroporis, tinea inquinalis), в т.ч. межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum); • грибковые инфекции ногтей (онихомикозы); • кандидозы кожи; • отрубевидный лишай; • дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). Препарат Нафтимакс эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос. **Способ применения и дозы** Наружно.	**Торговое наименование:** НАФТИФИН **Показания к применению** • грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea coroporis, tinea inquinalis), в т.ч. межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum); • грибковые инфекции ногтей (онихомикозы); • кандидозы кожи; • отрубевидный лишай; • дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). Препарат НАФТИФИН эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос. **Способ применения и дозы** Наружно.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2024 № 6998
(Входящий МЗ №4266809)

Старая редакция	Новая редакция
При поражении кожи. Препарат Нафтимакс наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах - 4 недели. *При поражении ногтей.* Препарат Нафтимакс наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата. **Особые указания** Препарат Нафтимакс не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует	*При поражении кожи.* Препарат НАФТИФИН наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах – 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. *При поражении ногтей.* Препарат НАФТИФИН наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах – до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. *Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата.* **Особые указания** Препарат НАФТИФИН не предназначен для применения в офтальмологии. Не сле-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2024 № 6998
(Входящий МЗ №4266809)

Старая редакция	Новая редакция
допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызвать раздражение кожи; при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** Препарат Нафтимакс не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. **Форма выпуска** Раствор для наружного применения 1 %. По 10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мл во флаконы-капельницы с винтовой горловиной из стекла марки ОС-1 или во флаконы темного укупоренные пробками-капельницами полимерными из полиэтилена высокого давления или пробками-капельницами полиэтиленовыми из полиэтилена высокого давления и навинчиваемыми полимерными крышками из полиэтилена низкого давления, или крышками полиэтиленовыми из полиэтилена низкого давления, или крышками с капельницей, или полимерными крышками, или укупо-	дует допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызвать раздражение кожи; при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** Препарат НАФТИФИН не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. **Форма выпуска** Раствор для наружного применения, 1 %. По 10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мл во флаконы-капельницы с винтовой горловиной из стекла марки ОС-1 или во флаконы темного стекла, укупоренные пробками-капельницами полимерными из полиэтилена высокого давления или пробками-капельницами полиэтиленовыми из полиэтилена высокого давления и навинчиваемыми полимерными крышками из полиэтилена низкого давления, или крышками полиэтиленовыми из полиэтилена низкого давления, или крышками с капельницей, или полимерными крышками, или крыш-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2024 № 6998
(Входящий МЗ №4266809)

Старая редакция	Новая редакция
ренные крышками навинчиваемыми с кисточкой или крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия со стеклянной пипеткой, или крышками навинчиваемыми с пипеткой, или диспенсерами. По 10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мл в бутылки темного стекла укупоренные пробками из натурального каучука или пробками резиновыми и алюминиевыми обжимными колпачками, или колпачками алюминиевыми в комплекте с крышками - капельницами натягиваемыми из полиэтилен высокого давления. По 10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мл во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата укупоренные крышками навинчиваемыми с кисточкой или крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия со стеклянной пипеткой, или крышками навинчиваемыми с пипеткой, или диспенсерами, или укупоренные пробками-капельницами полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми. На флаконы, флаконы-капельницы, бутылки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или этикетки из бумаги самоклеящейся. Каждый флакон, флакон-капельницу, бутылку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.	ками с капельницей, или укупоренные крышками навинчиваемыми с кисточкой, или крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия со стеклянной пипеткой, или крышками навинчиваемыми с пипеткой, или диспенсерами, или укупорены насадкой распылительной с колпачком или без колпачка. По 10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мл в бутылки темного стекла, укупоренные пробками из натурального каучука или пробками резиновыми и алюминиевыми обжимными колпачками или колпачками алюминиевыми в комплекте с крышками-капельницами натягиваемыми из полиэтилена высокого давления. По 10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мл во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата, укупоренные крышками навинчиваемыми с кисточкой, или крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия со стеклянной пипеткой, или крышками навинчиваемыми с пипеткой, или диспенсерами, или укупорены насадкой распылительной с колпачком или без колпачка, или укупоренные пробками-капельницами полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми. По 10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокого или низкого давления, укупоренные пробками-капельницами полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми, или во флаконы-капельницы полимер-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2024 № 6998
(Входящий МЗ №4266809)

Старая редакция	Новая редакция
	ные из полиэтилена высокого давления, укупоренные пробками капельницами полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми. На флаконы, флаконы-капельницы, бутылки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или этикетки из бумаги самоклеящейся. Каждый флакон, флакон-капельницу, бутылку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Генеральный директор

ООО «Женел РД» Воинова А. Д.