



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО

Внимательно прочитайте инструкцию по применению препарата перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Лекарственное средство, которым вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Облепиховое масло.

Международное непатентованное или группировочное наименование: Облепихи масло.

Лекарственная форма: масло для приема внутрь, местного и наружного применения.

Состав: *Действующее вещество:* облепиховое масло концентрат с содержанием каротиноидов в пересчете на β -каротин 300 мг % - 0,6 кг; *вспомогательное вещество:* масло подсолнечное - до 1,0 кг.

Описание

Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета с характерным запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при нагревании до 40 °С.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор растительного происхождения.

Код АТХ: D11A.

Фармакологические свойства

Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек различной этиологии (раневых, лучевых, ожоговых, язвенных); ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие.

Обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием (благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны).

Показания к применению

В качестве ранозаживляющего средства в комплексной терапии при поражениях кожи и слизистых оболочек: в гастроэнтерологии - при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; в гинекологии - кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки; в хирургии - для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах; в проктологии – при наружном геморрое, трещинах прямой кишки; в оториноларингологии - послеоперационные раны с целью ускорения заживления.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Для приёма внутрь - холецистит, холангит, панкреатит, гепатит, холелитиаз, детский возраст до 12 лет. При наружном и местном применении - профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны; для ректального введения - диарея.

С осторожностью:

При приёме внутрь - беременность, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь.

Наружно: при поражениях кожи применяют в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляции.

В оториноларингологии - при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками или гидрокортизоном, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения - 7-10 процедур.

Местно: при лечении кольпита, эндоцервицита, эрозии шейки матки, наружного геморроя, трещин прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите 10-15 процедур, эндоцервиците, эрозии шейки матки 8-12 процедур; при наружном геморрое, трещинах прямой кишки 5-7 процедур.

Внутрь: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день в течение 3-4 недель.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; при местном и наружном применении возможно ощущение жжения; при приеме внутрь: ощущение горечи во рту, диарея, желчная колика. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Лечение проводится под наблюдением врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Масло для приема внутрь, местного и наружного применения.

По 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми или пробками полимерными, или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и крышками полимерными навинчиваемыми, или «Топаз», или по 100 мл во флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом, или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми, или крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми, или по 50 и 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными, или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается нанесение текста инструкции на пачку.

Допускается укладка флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги или самоклеющуюся этикетку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год 6 мес. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии:

ОАО «Самарамедпром», 443070, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель

ОАО «Самарамедпром», 446100, РФ, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 99-Б.

ОАО «Самарамедпром», 443546, РФ, Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра-Дубрава, на территории завода «Коммунар», лит. Б, Б1, здание №2.

Генеральный директор

ОАО «Самарамедпром»



Найденов К.А.