

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Бинавит форте

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 100 мг + 0,2 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

МИНЗДРАВ РОССИИ

12 12 22

СОГЛАСОВАНО

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «__» 12 12 22 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Титульный лист МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Бинавит форте	Титульный лист МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА БИНАВИТ® форте
Торговое наименование: Бинавит форте	Торговое наименование: БИНАВИТ® форте
Состав 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит: <i>Действующие вещества:</i> пиридоксина гидрохлорид – 200 мг (в пересчете на 100 % вещество) тиамина гидрохлорид – 100 мг (в пересчете на 100 % вещество) цианокобаламин – 0,2 мг (в пересчете на 100 % вещество) <i>Вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая 102 – 80,00 мг, магния стеарат – 4,80 мг, повидон-К30 – 15,00 мг;	Состав 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит: <i>действующие вещества:</i> пиридоксина гидрохлорид – 200 мг (в пересчете на 100 % вещество) тиамина гидрохлорид – 100 мг (в пересчете на 100 % вещество) цианокобаламин – 0,2 мг (в пересчете на 100 % вещество) <i>вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая 102 – 80,00 мг, магния стеарат – 4,80 мг, повидон К30 – 15,00 мг;

Старая редакция	Новая редакция
<i>оболочка:</i> макрогол 6000 – 9,00 мг, титана диоксид – 13,50 мг, тальк – 30,00 мг, гипромеллоза – 7,50 мг.	<i>оболочка:</i> макрогол 6000 – 9,00 мг, титана диоксид – 13,50 мг, тальк – 30,00 мг, гипромеллоза – 7,50 мг.
Передозировка Клинические симптомы передозировки витаминов, содержащихся в препарате Бинавит форте, могут ожидать лишь после приема исключительно высоких доз в течение очень длительного времени. <i>Витамин B₁:</i> Тиамин имеет широкий терапевтический диапазон. Очень высокие дозы (>10 г) оказывают ганглиоблокирующее действие и подавляют передачу нервных импульсов, т.е. оказывают миорелаксирующее действие. <i>Витамин B₆:</i> Пиридоксин обладает очень малой токсичностью. Применение пиридоксина в течение 2 месяцев и более в дозе свыше 1 г в день, может вызывать нейротоксические эффекты. После приема внутрь более 2 г в сутки отмечались следующие эффекты: нейропатии с атаксией, нарушение чувствительности, церебральные судороги с изменениями на ЭКГ, а также, в отдельных случаях, гипохромная анемия и себорейный дерматит. <i>Витамин B₁₂:</i> После парентерального введения высокой дозы (а также в редких случаях после приема внутрь) наблюдались экзематозные изменения кожи и доброкачественная форма акне. <i>Лечение</i> при передозировке заключается в промывании желудочно-кишечного тракта, приеме активированного угля, назначении симптоматической терапии.	Передозировка Клинические симптомы передозировки витаминов, содержащихся в препарате БИНАВИТ® форте, могут ожидать лишь после приема исключительно высоких доз в течение очень длительного времени. <i>Витамин B₁:</i> Тиамин имеет широкий терапевтический диапазон. Очень высокие дозы (>10 г) оказывают ганглиоблокирующее действие и подавляют передачу нервных импульсов, т.е. оказывают миорелаксирующее действие. <i>Витамин B₆:</i> Пиридоксин обладает очень малой токсичностью. Применение пиридоксина в течение 2 месяцев и более в дозе свыше 1 г в день, может вызывать нейротоксические эффекты. После приема внутрь более 2 г в сутки отмечались следующие эффекты: нейропатии с атаксией; нарушение чувствительности; церебральные судороги с изменениями на ЭКГ; а также, в отдельных случаях, гипохромная анемия и себорейный дерматит. <i>Витамин B₁₂:</i> После парентерального введения высокой дозы (а также в редких случаях после приема внутрь) наблюдались экзематозные изменения кожи и доброкачественная форма акне. <i>Лечение</i> при передозировке заключается в промывании желудочно-кишечного тракта, приеме активированного угля, назначении симптоматической терапии.
Особые указания При длительном применении (более 6-12	Особые указания При длительном применении (более 6-12

Старая редакция	Новая редакция
мес.) витамина В₆ в суточной дозе 50 мг может возникать периферическая сенсорная нейропатия. Поэтому при длительной терапии рекомендуется регулярно контролировать состояние пациента. При появлении признаков периферической сенсорной нейропатии (парестезии) необходимо скорректировать дозу и, при необходимости, прекратить прием препарата. При приеме витамина В₁₂ клиническая картина, а также лабораторные показатели при фуникулярном миелозе или пернициозной анемии, могут терять свою специфичность. Витамин В₁₂ может маскировать симптомы дефицита фолиевой кислоты. Во время приема препарата Бинавит форте не рекомендуется прием поливитаминных комплексов, включающих в состав витамины группы В.	мес.) витамина В₆ в суточной дозе 50 мг может возникать периферическая сенсорная нейропатия. Поэтому при длительной терапии рекомендуется регулярно контролировать состояние пациента. При появлении признаков периферической сенсорной нейропатии (парестезии) необходимо скорректировать дозу и, при необходимости, прекратить прием препарата. При приеме витамина В₁₂ клиническая картина, а также лабораторные показатели при фуникулярном миелозе или пернициозной анемии, могут терять свою специфичность. Витамин В₁₂ может маскировать симптомы дефицита фолиевой кислоты. Во время приема препарата БИНАВИТ® форте не рекомендуется прием поливитаминных комплексов, включающих в состав витамины группы В.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Бинавит форте не оказывает влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами.	Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами БИНАВИТ® форте не оказывает влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами.

Медицинский директор
АО «Бинергия»



Ханина Н.Ю.