

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Нейробион®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг+100 мг+0,2 мг

лекарственная форма, дозировка

Пи энд Джи Хелс Острия ГмбХ энд Ко. ОГ, Австрия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Передозировка	Передозировка
	В случае передозировки следует прекратить применение препарата и обратиться за медицинской помощью.
Симптомы	Симптомы
Витамин В₁	Витамин В₁
Тиамин имеет широкий терапевтический диапазон. Очень высокие дозы (>10 г) оказывают ганглиоблокирующее действие и подавляют передачу нервных импульсов, т.е. оказывают миорелаксирующее действие.	Тиамин имеет широкий терапевтический диапазон. Очень высокие дозы (>10 г) оказывают ганглиоблокирующее действие и подавляют передачу нервных импульсов, т.е. оказывают миорелаксирующее действие.
Витамин В₆	Витамин В₆
Пиридоксин обладает очень малой токсичностью.	Пиридоксин обладает очень малой токсичностью.
При передозировке после приема внутрь более 2 г в сутки отмечались следующие эффекты: невропатии с атаксией, нарушение чувствительности, церебральные судороги с изменениями на ЭКГ, а также, в отдельных случаях, гипохромная анемия и себорейный дерматит.	При передозировке после приема внутрь более 2 г в сутки отмечались следующие эффекты: невропатии с атаксией, нарушение чувствительности, церебральные судороги с изменениями на ЭКГ, а также, в отдельных случаях, гипохромная анемия и себорейный дерматит.

Старая редакция	Новая редакция
Сенсорная нейропатия и другие синдромы нейропатии, которые могут быть вызваны длительным применением высоких доз пиридоксина, постепенно исчезают при отмене препарата. <i>Витамин В₁₂</i> После парентерального введения высокой дозы (а также в редких случаях после приема внутрь) наблюдались экзематозные изменения кожи и доброкачественная форма акне. <i>Лечение</i> Терапевтические меры при передозировке заключаются в промывании желудочно-кишечного тракта, приеме активированного угля, назначении симптоматической терапии.	Сенсорная нейропатия и другие синдромы нейропатии, которые могут быть вызваны длительным применением высоких доз пиридоксина, постепенно исчезают при отмене препарата. <i>Витамин В₁₂</i> После парентерального введения высокой дозы (а также в редких случаях после приема внутрь) наблюдались экзематозные изменения кожи и доброкачественная форма акне. <i>Лечение</i> Терапевтические меры при передозировке заключаются в промывании желудочно-кишечного тракта, приеме активированного угля, назначении симптоматической терапии.
Особые указания В литературе описаны случаи нейропатии после длительного (6-12 месяцев) применения витамина В₆ в дозе, в среднем превышающей 50 мг в сутки. Поэтому при длительной терапии рекомендуется регулярное наблюдение за пациентом. При появлении признаков периферической сенсорной нейропатии (парестезии) необходимо скорректировать дозу и, при необходимости, прекратить прием препарата. При приеме витамина В₁₂ клиническая картина, а также лабораторные показатели при фуникулярном миелозе или пернициозной анемии могут терять свою специфичность. Цианокобаламин может маскировать симптомы дефицита фолиевой кислоты.	Особые указания В литературе описаны случаи нейропатии после длительного (6-12 месяцев) применения витамина В₆ в дозе, в среднем превышающей 50 мг в сутки. Поэтому при длительной терапии рекомендуется регулярное наблюдение за пациентом. При появлении признаков периферической сенсорной нейропатии (парестезии) необходимо скорректировать дозу и, при необходимости, прекратить прием препарата. Следует прекратить применение препарата, если симптомы сохраняются. При применении витамина В₁₂ (цианокобаламина) возможно уменьшение проявлений фолиеводефицитной мегалобластной анемии. Возможно улучшение состояния за счет присутствия в составе препарата витамина В₁₂

Старая редакция	Новая редакция
Препарат Нейробион [®] , таблетки, покрытые оболочкой, содержит лактозу и сахарозу, поэтому применение препарата не рекомендуется у пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы или фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией, дефицитом лактазы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.	(цианокобаламина), поэтому необходимо убедиться в том, что применение препарата не маскирует правильный диагноз. Препарат Нейробион [®] , таблетки, покрытые оболочкой, содержит лактозу и сахарозу, поэтому применение препарата не рекомендуется у пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы или фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией, дефицитом лактазы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Старший специалист по регистрации
ООО «Др. Редди'с Лабораторис»



Андросова Е.В.