

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ПУСТЫРНИК ФОРТЕ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пустырник форте

Международное непатентованное или группировочное наименование: пустырника трава

Лекарственная форма: таблетки

Состав на 1 таблетку:

Действующее вещество: пустырника экстракт сухой с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутозид и абсолютно сухое вещество 0,5 % - 28,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза – 260,0 мг, лактозы моногидрат (сахар молочный) – 218,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 120,0 мг, крахмал картофельный – 80,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия – 37,0 мг, магния стеарат – 7,0 мг.

Описание: Круглые плоскоцилиндрические таблетки от светло-серого с коричневатым оттенком до светло-коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями, с риской и фаской, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ: N05CM

Фармакологические свойства

Оказывает успокаивающее действие, снижает частоту и увеличивает силу сердечных сокращений, проявляет гипотензивные свойства. По характеру действия близок к препаратам валерианы.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, неврастения, бессонница, нейроциркуляторная дистония.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазу обострения, артериальная гипотензия, дефицит лактазы и/или сахаразы/изомальтазы, непереносимость лактозы и/или фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке (28 мг) 1-2 раза в день за час до еды. Курс лечения – 3-4 недели. Проведение повторного курса возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, диспепсия.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При случайной передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

При передозировке необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с другими седативными и кардиологическими препаратами; усиливает действие снотворных и анальгезирующих средств.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Пустырник Форте проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка препарата содержит 0,01 ХЕ (углеводных единиц).

При отсутствии эффекта при приеме препарата в течение 2-х недель следует обратиться к врачу. Не рекомендуется превышать максимальные сроки приема и рекомендованные дозы препарата при самостоятельном применении.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки 28 мг.

По 3, 4, 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток в банки из полиэтилентерефталата для лекарственных средств или полипропиленовые для лекарственных средств, укупоренные крышками из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия, или крышками полипропиленовыми с системой «нажать-повернуть», или крышками из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия.

Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель:

Держатель РУ: ООО «Атолл»,

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6

Производитель, ответственный за выпускающий контроль качества: ООО «Озон», Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения: ООО «Озон»

445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.


Тел.: +79874599991, +79874599992

E-mail: ozon@ozon-pharm.ru

Директор ООО «Атолл»



ООО «Управляющая компания» в
лице Секретаря Правления
Грядунова П.Е.
28.11.2019



123819