

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Розарт

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг

Актавис Лтд., Мальта

Изменение № 9



Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ <.....> <i>Со стороны кожи и подкожных тканей:</i> частота неизвестна - синдром Стивенса-Джонсона, лекарственная реакция с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS). <.....> <i>Далее по тексту.</i>	ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ <.....> <i>Со стороны кожи и подкожных тканей:</i> нечасто - кожный зуд, сыпь, крапивница; частота неизвестна - синдром Стивенса-Джонсона, лекарственная реакция с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS). <.....> <i>Далее по тексту.</i>

Менеджер по регистрации



Д.Д. Столярова



151419