

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Солодки корня сироп

Регистрационный номер:**Торговое наименование**

Солодки корня сироп

Международное непатентованное или группировочное наименование

Солодки корней экстракт

Лекарственная форма

Сироп

Состав на 1 г*Активный компонент:*

Солодки корней экстракт (Солодки экстракт густой)	- 40 мг
--	---------

Вспомогательные вещества:

Сахароза	- 550,4 мг
Этанол (спирт этиловый) 96 %	- 91,3 мг
Вода очищенная	- 318,3 мг

Описание

Густая жидкость коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA

Фармакологические свойства

Препарат оказывает отхаркивающее действие, обусловленное, в первую очередь, наличием глицирризина, усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Показания к применению

Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом, при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и

двенадцатиперстной кишки в период обострения, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, сахарный диабет, детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь. Перед применением сироп следует взболтать!

Взрослым и детям старше 12 лет – по 5 мл (1 чайной ложке), предварительно разведенных в ½ стакана воды, 3 раза в день.

Детям до 2 лет – по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день.

Детям с 2 до 6 лет – по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день.

Детям с 6 до 12 лет – по 2,5 мл (1/2 чайной ложки), предварительно разведенных в ½ стакана воды, 3 раза в день.

Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом.

При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (диарея). При длительном применении возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-электролитного обмена.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание сахарозы в одной чайной ложке (5 мл) сиропа соответствует 0,11 хлебным единицам (ХЕ), в 1 капле – 0,01 ХЕ.

Содержание абсолютного этилового спирта в 1 чайной ложке (5 мл) препарата составляет 0,43 г; максимальная суточная доза (15 мл) – 1,4 г абсолютного этилового спирта; в 1 капле (для детей) – 0,0025 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Сироп.

По 100 г во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными из полиэтилена высокого давления и крышками полимерными навинчиваемыми из полиэтилена высокого/низкого давления.

По 100 г во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Упаковка для стационаров

По 5 кг, 11 кг или 20 кг в канистры окрашенные из полиэтилена низкого давления, укупоренные крышками полимерными навинчивающимися из полиэтилена низкого давления, или из полипропилена.

По 17 кг или 20 кг в бутылки стеклянные, укупоренные крышками полимерными навинчивающимися из полиэтилена низкого давления с прокладками из полиэтилена высокого давления (поставляются в комплекте с бутылками).

Каждую бутылку помещают в барабан/бочку полимерную окрашенную из полиэтилена низкого давления с плотно закрывающейся крышкой.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»,

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д. 1

тел. +7 (495) 956-05-71

www.mosfarma.ru

Начальник отдела регистрации
ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика»



Н.А. Шишкин