

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Депренорм® МВ

наименование лекарственного препарата

**таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой, 70 мг**

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «30 07 19» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование: Депренорм® МВ	Торговое наименование: Депренорм® ОД Аналогичные изменения торгового наименования вносятся по тексту инструкции.
Лекарственная форма: таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой.	Лекарственная форма: таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.
Состав 1 таблетка пролонгированного действия, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>активное вещество:</i> триметазидина	Состав 1 таблетка с пролонгированным высвобождением, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>действующее вещество:</i>

Изменение № 1 к ЛП 002091-120718 С. 2

Старая редакция	Новая редакция
дигидрохлорид 70 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 171 мг; карбомер 2 мг; кремния диоксид коллоидный 6 мг; магния стеарат 3 мг; масло растительное гидрогенизированное 3 мг; целлюлоза микрокристаллическая 195 мг; <i>состав пленочной оболочки:</i> Опадрай II розовый 15 мг, в том числе: поливиниловый спирт 6 мг, полиэтиленгликоль (макрогол) 3,03 мг, тальк 2,22 мг, титана диоксид 2,8395 мг, краситель солнечный закат желтый 0,381 мг, краситель индигокармин 0,2175 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] 0,312 мг.	триметазидина дигидрохлорид 70,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 171,00 мг; карбомер 10,97 мг; кремния диоксид коллоидный 6,00 мг; магния стеарат 3,00 мг; целлюлоза микрокристаллическая 189,03 мг; <i>состав пленочной оболочки:</i> Опадрай прозрачный 2,60 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 2,08 мг; макрогол-4000 (полиэтиленгликоль-4000) 0,52 мг; Опадрай II розовый 12,40 мг, в том числе: краситель солнечный закат желтый 0,3150 мг; краситель пунцовый [Понсо 4R] 0,2579 мг; краситель индигокармин 0,1798 мг; поливиниловый спирт 4,9600 мг; макрогол-4000 (полиэтиленгликоль- 4000) 2,5048 мг; тальк 1,8352 мг, титана диоксид 2,3473 мг.
Форма выпуска Таблетки пролонгированного	Форма выпуска Таблетки с пролонгированным

Изменение № 1 к ЛП 002091-120718 С. 3

Старая редакция	Новая редакция
действия, покрытые пленочной оболочкой, 70 мг. По 7, 10, 14 или 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 2, 4 контурных ячейковых упаковки по 7 таблеток или по 1, 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2, 4 контурных ячейковых упаковки по 14 таблеток или по 1, 2, 4 контурных ячейковых упаковки по 15 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 70 мг. По 7, 10, 14 или 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 60 или 90 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена высокой плотности/полиэтилена низкого давления/полиэтилентерефталата, с крышкой натягиваемой или навинчиваемой из полипропилена/полиэтилена низкого давления. Допустимо использование крышек, обеспечивающих защиту от детей и/или контроль первого вскрытия. Допустимо для контроля первого вскрытия использовать термоусадочную пленку из поливинилхлорида. По 2, 4 контурных ячейковых упаковки по 7 таблеток или по 1, 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, или по 1, 2, 4 контурных ячейковых упаковки по 14 таблеток,

118727


Изменение № 1 к ЛП 002091-120718 С. 4

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года Не применять по истечении срока годности. Условия отпуска По рецепту.	или по 1, 2, 4 контурных ячейковых упаковки по 15 таблеток, или по 1 банке полимерной вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Условия хранения При температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (пачке картонной). Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года Не применять по истечении срока годности. Условия отпуска Отпускают по рецепту.

Директор департамента по регуляторным вопросам, клиническим исследованиям и разработкам новых ЛС
ЗАО «Канонфарма продакшн»



О.А. Лисакович



118727