

МИНЗДРАВ РОССИИ
120522
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Стрепсилс® Интенсив

наименование лекарственного препарата

таблетки для рассасывания [медово-лимонные],

таблетки для рассасывания [апельсиновые]

лекарственная форма, дозировка

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Великобритания

наименование производителя, страна

Изменение № 2

120522

Дата внесения Изменения « ____ » ____ 20 ____ г.


Старая редакция	Новая редакция
Описание Таблетки для рассасывания [медово-лимонные]: круглые таблетки из полупрозрачной карамельной массы от светло-желтого до светло-коричневого цвета, с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета. Таблетки для рассасывания [апельсиновые]: круглые таблетки из полупрозрачной карамельной массы от белого до светло-желтого цвета, с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается наличие	Описание Таблетки для рассасывания [медово-лимонные]: круглые таблетки из полупрозрачной карамельной массы от светло-желтого до светло-коричневого цвета, с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Таблетки для рассасывания [апельсиновые]: круглые таблетки из полупрозрачной карамельной массы от белого до светло-желтого цвета, с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет,

1136777

Старая редакция	Новая редакция
пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета.	неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.
Состав Одна таблетка для рассасывания содержит <i>действующее вещество:</i> флурбипрофен 8,75 мг, <i>вспомогательные вещества:</i> таблетки для рассасывания [медово-лимонные]: макрогол 300 5,47 мг, калия гидроксид 2,19 мг, сахароза жидкая 1407 мг, левоментол 2 мг, декстроза 1069 мг, мед 50,4 мг, лимонный ароматизатор (502904 А) 3,6 мг. таблетки для рассасывания [апельсиновые]: макрогол 300 5,47 мг, калия гидроксид 2,19 мг, апельсиновый ароматизатор PHL-010300 10 мг, левоментол 2 мг, ацесульфам калия 3 мг, изомальт 2033,29 мг, мальтитол жидкий 509,31 мг.	Состав Одна таблетка для рассасывания содержит <i>действующее вещество:</i> флурбипрофен 8,75 мг, <i>вспомогательные вещества:</i> таблетки для рассасывания [медово-лимонные]: макрогол 300 5,47 мг, калия гидроксид 2,19 мг, сахароза жидкая 1407 мг, левоментол 2 мг, декстроза жидкая (жидкая глюкоза) 1069 мг, мед 50,4 мг, лимонный ароматизатор (502904 А) 3,6 мг. таблетки для рассасывания [апельсиновые]: макрогол 300 5,47 мг, калия гидроксид 2,19 мг, апельсиновый ароматизатор PHL-010300 10 мг, левоментол 2 мг, ацесульфам калия 3 мг, изомальт 2033,29 мг, мальтитол жидкий 509,31 мг.

Старший специалист по регистрации
ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Кретьева З.С.



136777