

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР

Лекарственная форма: Эликсир

Состав

Водно-спиртовое извлечение «Алтайский»

(из 24 видов лекарственного сырья: сосны кедровой сибирской семена, брусники листья, родиолы розовой корневища и корни, шиповника плоды, бадана корневища, солодки корни, ромашки цветки, душицы трава, толокнянки листья, черемухи плоды, элеутерококка корневища и корни, зверобоя трава, боярышника цветки, боярышника плоды, шалфея листья, подорожника большого листья, тысячелистника трава, рапунтикума сафлоровидного корневища с корнями, лапчатки корневища, кориандра плоды, чага, полыни горькой трава, пиона уклоняющегося корневища с корнями, аронии черноплодной плоды) с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин 200 мг/л

Сок яблочный

Мед натуральный

Колер эликсирный

Спирт этиловый 95% (этанол)

Вода очищенная

297,5 мл

21,0 мл

45,0 г

80,0 г

251,5 г

до 1000 мл

Описание

Жидкость коричневого цвета, со специфическим запахом. Допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующее средство растительного происхождения.

Код АТХ: A13A

Фармакологическое действие

Препарат оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие.

Показания к применению

Алтайский эликсир применяется при астенических состояниях, умственном и физическом перенапряжении, в период реконвалесценции после тяжелых инфекционных и воспалительных заболеваний, в послеоперационном периоде.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острая сердечно-сосудистая и почечная недостаточность, артериальная гипертензия, эпилепсия, судорожные состояния, расстройство сна, острые инфекционные заболевания, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 18 лет).

С осторожностью: сахарный диабет.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым по 2-3 чайные ложки (10-15 мл) на 100 мл воды или чая 2 раза в день за 10-15 минут до еды. Курс лечения 10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тахикардия, нарушения сна, головная боль.

Передозировка

Сведения о передозировке до настоящего времени отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

В составе препарата содержится 37-40% этилового спирта.

Препарат не рекомендуется принимать во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Форма выпуска

Эликсир по 100 мл, 250 мл в бутылки стеклянные темного или обесцвеченного стекла. Каждую бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. Допускается нанесение текста инструкции по применению на пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре 15 - 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген»

Адрес: 188686, Ленинградская обл, Всевожский район, пос. Щеглово, д. 53а

Тел.: (812) 336-16-82, 336-16-83, (81370) 68-289

Директор ИДК ЭИС



С.В.Буданов

Генеральный директор
ЗАО «ФП «Мелиген»

Г.П.Ефимов

