

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ГЛИЦИРАМ

наименование лекарственного препарата

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

Регистрационный номер:

Торговое название: Глицирам

Группировочное название: Аммония глицирризинат&

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активное вещество

Глицирам

– 0,05 г

(Аммония глицирризинат)

в пересчете на 100 % вещество

Вспомогательные вещества

Натрия хлорид

– 0,100 г

Крахмал картофельный

– 0,008 г

Тальк

– 0,001 г

Кальция стеарат	– 0,001 г
Масса таблетки	– 0,16 г

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого с желтоватым оттенком до желтого с коричневатым оттенком цвета с вкраплениями более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство.

Код АТХ

[R07AX].

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное, умеренное отхаркивающее действие, стимулирует функцию коры надпочечников.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в составе комплексной терапии при заболеваниях дыхательных путей с трудно отделяемой мокротой (в том числе при легких формах бронхиальной астмы).

Экзема, аллергический дерматит, болезнь Аддисона (дисэнцефально-гипофизарные формы, как самостоятельно, так и в сочетании с адренокортикотропным гормоном), астенические состояния и гипотонический синдром, гипофункция коры надпочечников на фоне длительной терапии глюкокортикостероидами, в том числе профилактика синдрома «отмены» в период прекращения лечения глюкокортикостероидами или снижения их дозировки (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые органические поражения сердца и паренхиматозных органов, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 10 лет.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. Взрослым и детям старше 10 лет – по 1-2 таблетки 2 раза в день. В более тяжелых случаях разовая доза препарата составляет 2 таблетки 3-6 раз в день. Длительность лечения – от 2 недель до 6 месяцев. Возможность повторных курсов, дозы препарата и длительность лечения определяются врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При длительном применении в высоких дозах возможна задержка выведения воды из организма.

Передозировка

Возможно нарушение функций печени.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Возможно усиление действия препаратов, стимулирующих функцию коры надпочечников.

Особые указания

Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки 50 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.


Производитель/предприятие, принимающее претензии

ЗАО «ВИФИТЕХ»

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Генеральный директор
ЗАО «ВИФИТЕХ»



С.А. Постельников
ФИО