

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Примовист®

раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл

Байер Фарма АГ, Германия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения « ____ » **2004 17** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл. Флаконы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или USP) объемом 6 мл и 10 мл с наполнением 5; 7,5 и 10 мл, укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алюминиевым колпачком с цветным пластиковым диском. Предварительно наполненные шприцы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или USP) объемом 10 мл с наполнением 5; 7,5 и 10 мл с плунжером и верхней крышкой из хлорбутил-эластомера типа 1 (Евр.Фарм.) черного цвета. 1, 5 или 10 флаконов вместе с ин-	Форма выпуска Раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл. По 5 мл, 7,5 мл или 10 мл во флаконы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или USP) укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алюминиевым колпачком с цветным пластиковым диском. Предварительно наполненные по 5 мл, 7,5 мл или 10 мл шприцы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или USP) или пластиковые шприцы. Каждый шприц помещают в специальный герметичный контейнер из ПВХ и ламинированной бумаги.

струкцией по применению в картонной пачке. 1, 5 или 10 шприцев в блистерах вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. Срок годности 5 лет. Не использовать по истечении срока годности. Срок годности после первого открытия контейнера Примовист химически и физически стабилен. С точки зрения микробиологии, данный препарат должен быть использован непосредственно после открытия.	По 1, 5 или 10 флаконов или по 1, 5 или 10 шприцев в контейнерах вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. Срок годности 5 лет (флаконы и стеклянные шприцы). 3 года (пластиковые шприцы). Не использовать по истечении срока годности. Срок годности после первого открытия контейнера Примовист химически и физически стабилен. С точки зрения микробиологии, данный препарат должен быть использован непосредственно после открытия.
--	--

Руководитель по управлению регуляторной политикой АО «БАЙЕР»

Сычева Е.И.

