

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Примовист®

Раствор для внутривенного введения, 0,25 ммоль/мл

Байер АГ, Германия

Изменение № 8

Дата внесения Изменения «01 08 19» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл. По 5 мл, 7,5 мл или 10 мл во флаконы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или Ф.США) укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алюминиевым колпачком с цветным пластиковым диском. Предварительно наполненные по 5 мл, 7,5 мл или 10 мл шприцы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или Ф.США) или пластиковые шприцы. Каждый шприц помещают в специальный герметичный контейнер.	Форма выпуска Раствор для внутривенного введения, 0,25 ммоль/мл. По 5 мл, 7,5 мл или 10 мл во флаконы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или Ф.США), укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алюминиевым колпачком с цветным пластиковым диском. Предварительно наполненные по 5 мл, 7,5 мл или 10 мл шприцы из бесцветного стекла типа 1 (Евр.Фарм. или Ф.США) или бесцветные прозрачные шприцы из циклоолефинового полимера. Каждый шприц помещают в

С.2

Старая редакция	Новая редакция
из ПВХ и ламинированной бумаги. По 1, 5 или 10 флаконов или по 1, 5 или 10 шприцев в контейнерах вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.	специальный герметичный контейнер из ПВХ и ламинированной бумаги. По 1, 5 или 10 флаконов или по 1, 5 или 10 шприцев в контейнерах вместе с инструкцией по применению в картонной пачке, снабженной контролем первого вскрытия.

Руководитель отдела регуляторных
отношений АО «БАЙЕР»



Сычева Е.И.