ЛСР-002282/08-010408

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Венарус®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Венарус®

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Описание:
Таблетки, покрытые оболочкой оранжево-розового цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы со скругленными концами, с риской. На поперечном разрезе видны два слоя.

Состав:
Активные вещества:
Диосмина 0,45 г
Гесперидина 0,05 г
Вспомогательные вещества (ядро): желатин, магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза,крахмал гликолят натрия, тальк
Вспомогательные вещества (оболочка): полиэтиленгликоль 6000, магния стеарат, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лаурилсульфат, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид желтый

Фармакотерапевтическая группа:
ангиопротектор

Код АТХ C05CA53

Фармакологические свойства
Фармакодинамика: Оказывает ангиопротекторное и венотонизирующее действие. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает венозный застой; снижает проницаемость, ломкость капилляров и увеличивает их резистентность; улучшает микроциркуляцию и лимфоотток. При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы.

Фармакокинетика: Период полувыведения составляет- 11 ч. Выводится желудочнокишечным трактом и почками.

Показания: Венозная недостаточность нижних конечностей функциональной и органической природы (ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, трофические нарушения), острый и хронический геморрой.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период лактации.

ЗАО "ОБОЛЕНСКОЕ" ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОГРН 1025007748980 "ОБОЛЕНСКОЕ" 3 ПРЕДПРИЯТИЕ ИНН 5077009710

Бурнов.

Режим дозирования: Внутрь. При венозной недостаточности - по 1-2 таблетки в сутки (в полдень и вечером во время еды). При остром геморрое - 6 таблеток в сутки в течение первых 4 дней, затем 4 таблетки в сутки в течение 3 дней.

Побочные эффекты: Диспепсия, вегетативная лабильность.

Особые указания: При беременности применение возможно (эксперименты не показали тератогенных эффектов; до настоящего времени не было сообщений о каких-либо нежелательных эффектах при применении препарата у беременных женщин), при лактации - не рекомендуется из-за отсутствия данных о попадании препарата в грудное молоко. При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет специфического лечения др. анальных нарушений. Продолжительность лечения должна быть короткой. В случае, если короткая терапия не дает положительного эффекта, необходимо провести проктологическое исследование и пересмотреть применяемую терапию.

Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг.
По 10 или 15 таблеток, покрытых оболочкой, в контурную ячейковую упаковку.
По 2 или 3 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности
2 года.
Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения
Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Отпуск из аптек
По рецепту.

Производитель/предприятие принимающее претензии:
ЗАО «ФП «Оболенское», 142279, Московская обл., Серпуховской р-он, п. Оболенск, корп. 7-8.
Тел./факс (4967) 36-01-07

Директор ИДКЭЛС С.В. Буданов

Директор ЗАО «ФП» Оболенское» Е.В.Зимин