МИНЗДРАВ РОССИИ
ЯСР-002282/08-070814
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Венарус®
таблетки, покрытые оболочкой 500 мг

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 070814 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакотерапевтическая группа: ангиопротектор	**Фармакотерапевтическая группа:** Венотонизирующее и венопротекторное средство
Фармакокинетика: Период полувыведения составляет- 11 ч. Выводится желудочнокишечным трактом и почками.	**Фармакокинетика:** Основное выделение препарата происходит с калом. С мочой в среднем выводится около 14% принятого количества препарата. Период полувыведения составляет 11 часов. Препарат подвергается активному метаболизму, что подтверждается присутствием феноловых кислот в моче.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам	**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к активным

Старая редакция	Новая редакция
препаратам, период лактации.	компонентам или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. Не рекомендуется прием препарата кормящим женщинам.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Раздел отсутствует.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** *Беременность* Эксперименты на животных не выявили тератогенных эффектов. До настоящего времени не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата беременными женщинами. *Период грудного вскармливания* Из-за отсутствия данных относительно экскреции препарата в грудное молоко, кормящим женщинам не рекомендуется прием препарата.
Режим дозирования: Внутрь. При венозной недостаточности – по 1-2 таблетки в сутки (в полдень и вечером во время еды). При остром геморрое – 6 таблеток в сутки в течение первых 4 дней, затем 4 таблетки в сутки в течение 3 дней.	**Способ применения и дозы:** Внутрь. Рекомендуемая доза при венозно-лимфатической недостаточности – 2 таблетки в сутки: 1 таблетка – в середине дня и 1 таблетка – вечером, во время приема пищи. Рекомендуемая доза при остром геморрое – 6 таблеток в сутки: по 3

Старая редакция	Новая редакция
Побочные эффекты: Диспепсия, вегетативная лабильность.	таблетки утром и по 3 таблетки вечером в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в сутки: по 2 таблетки утром и по 2 таблетки вечером в течение последующих 3 дней. **Побочное действие:** Частота развития нежелательных реакций представлена следующим образом: очень часто (≥1/10 случаев), часто (≥1/100 и <1/10 случаев), нечасто (≥1/1000 и <1/100 случаев), редко (≥1/10000 и <1/1000 случаев) и очень редко (<1/10000 случаев). Нежелательные реакции, частоту развития которых не представляется возможным оценить по доступным данным, имеют обозначение «частота неизвестна». *Со стороны центральной нервной системы:* редко - головокружение, головная боль, общее недомогание; частота неизвестна – судороги. *Со стороны желудочно-кишечного тракта:* часто - диарея, диспепсия, тошнота, рвота; нечасто – колиты; частота неизвестна – боли в животе. *Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и*

Старая редакция	Новая редакция
	средостения: частота неизвестна – першение в горле, боль в груди. *Со стороны кожных покровов:* редко - сыпь, зуд, крапивница; частота неизвестна – дерматит аллергический, гиперемия, изолированный отек лица, губ, век, в исключительных случаях ангионевротический отек. *Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили другие нежелательные реакции не указанные в инструкции,* ***сообщите об этом врачу***.
Передозировка: Раздел отсутствует.	**Передозировка:** Случаев передозировки не описано. *При передозировке препарата немедленно обратитесь за медицинской помощью.*
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Раздел отсутствует.	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Не отмечалось. *Следует информировать лечащего врача обо всех принимаемых лекарственных препаратах.*
Особые указания: При беременности применение возможно (эксперименты не показали тератогенных эффектов;	**Особые указания:** При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет

Старая редакция	Новая редакция
до настоящего времени не было сообщений о каких-либо нежелательных эффектах при применении препарата у беременных женщин), при лактации - не рекомендуется из-за отсутствия данных о попадании препарата в грудное молоко. При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет специфического лечения др. анальных нарушений. Продолжительность лечения должна быть короткой. В случае, если короткая терапия не дает положительного эффекта, необходимо провести проктологическое исследование и пересмотреть применяемую терапию.	специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать сроки, указанные в разделе «Способ применения и дозы». В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса терапии, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть применяемую терапию. При наличии нарушений венозного кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием терапии со здоровым (сбалансированным) образом жизни: желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также снижение избыточной массы тела. Пешие прогулки и, в некоторых случаях, ношение специальных чулок, способствует улучшению циркуляции крови.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами и заниматься другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации	**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами и заниматься другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации**

Старая редакция	Новая редакция
внимания: Раздел отсутствует. **Условия хранения** Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. **Отпуск из аптек** По рецепту. **Производитель/предприятие принимающее претензии:** ЗАО «ФП «Оболенское», 142279, Московская обл., Серпуховской р-он, п. Оболенск, корп. 7-8. Тел./факс (4967) 36-01-07	**внимания:** Не влияет. **Условия хранения** В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. **Условия отпуска** Отпускается без рецепта. **Производитель/организация, принимающая претензии** ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия, 142279, Московская обл., Серпуховский район, п. Оболенск, корп. 7-8 Тел./факс: (4967) 36-01-07 www.obolensk.ru

Директор по регистрации Г.У. Сетдекова