МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ГЕРПФЕРОН®

Регистрационный номер _____

Торговое название препарата

Герпферон®

Международное непатентованное название

Интерферон альфа-2b + ацикловир + лидокаин

Лекарственная форма

мазь для местного и наружного применения

Состав

На 1 г мази:

Действующие вещества: Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный не менее 20 000 МЕ; ацикловир 30 мг, лидокаина гидрохлорид 10 мг.

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат 2 мг, макрогол 1500 – 290 мг, макрогол 400 – 660 мг.

Описание

Мазь белого или белого с кремоватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство для местного применения

Код АТХ

D06BB

Фармакологическое действие

Герпферон®, мазь для местного и наружного применения - комбинированный препарат, обладающий противовирусным, противовоспалительным, иммуномодулирующим и обезболивающим действием.

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает выраженной противовирусной активностью (подавляет репликацию вируса в инфицированных клетках) и иммуномодулирующим эффектом (усиление фагоцитарной активности макрофагов в очагах поражения).

Ацикловир обладает выраженным противовирусным действием. Высокоактивен в отношении вируса Herpes simplex 1 и 2 типа; вируса, вызывающего ветряную оспу и опоясывающий лишай (Varicella zoster).

Лидокаин оказывает местноанестезирующее и умеренное противозудное действие.

Сочетание действующих веществ обеспечивает более выраженный противогерпетический эффект: предупреждает образование новых элементов сыпи, снижает вероятность кожной диссеминации, ускоряет заживление, снижает болевые ощущения.

Фармакокинетика

При применении мази системная абсорбция низкая: на интактной коже - всасывание минимальное, в крови и моче не определяется, на пораженной коже всасывание умеренное.

Показания к применению

Первичные и рецидивирующие герпетические поражения кожи и слизистых оболочек, генитальный герпес, опоясывающий герпес.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Данные по использованию препарата во время беременности и в период кормления грудью отсутствуют. Поэтому применять препарат у этих категорий больных следует только, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Способ применения и дозы

Препарат Герпферон®, мазь для местного и наружного применения наносят на пораженные участки кожи и слизистых тонким слоем 5 раз в день с интервалом 4 часа. Продолжительность курса лечения составляет 5-10 дней.

Побочное действие

Возможно шелушение кожи в месте длительного нанесения мази.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не выявлены.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат совместим и хорошо сочетается с противовоспалительными и иммуномодулирующими лекарственными средствами.

Особые указания

Эффективность лечения препаратом будет тем выше, чем раньше оно начато (при первых признаках инфекции).

Не влияет на способность управления транспортным средством или на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа с движущимися механизмами и пр.).

Форма выпуска

Мазь по 5 г, 10 г, 30 г в тубах алюминиевых с бушонами.

Одна туба вместе с инструкцией по применению помещена в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Препарат хранят при температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «ФИРН М», 143390, М.О. Наро-Фоминский район, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д.4

Рекламации на качество препарата направлять в адрес предприятия-производителя:

ЗАО «ФИРН М», 127055, г. Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В». Тел. (495) 956-15-43.

Генеральный директор
ЗАО «ФИРН М» **Н.Е.Кириллов**