МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭЛАКОСЕПТ®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.
Элакосепт®.

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНОТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.
«~»

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.
Сбор-порошок.

СОСТАВ.

Календулы лекарственной цветки	20 %
Солодки корни	20 %
Шалфея лекарственного листья	20 %
Эвкалипта прутовидного листья	20 %
Ромашки аптечной цветки	10 %
Череды трехраздельной трава	10 %

ОПИСАНИЕ.
Смесь неоднородных частиц растительного сырья серо-зеленого цвета с вкраплениями оранжевого, желто-оранжевого, желтого, белого и коричневатого цвета. Запах ароматный. Вкус водного извлечения сладковатый.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.
Противомикробное средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Настой «Элакосепта®» обладает антимикробной активностью в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протея и некоторых других микроорганизмов; оказывает противовоспалительное действие и стимулирует репаративные процессы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
В составе комплексной терапии*: заболеваний дыхательных путей и ЛОР-органов* (хронический тонзиллит, острый ларингофарингит, острый и

135530

хронический фарингит, трахеит, бронхит); *в стоматологии* (острый и рецидивирующий афтозный стоматит, красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта, пародонтит); *в гастроэнтерологии* (хронический гастродуоденит, энтерит, колит, энтероколит); *в дерматологии* (микробная экзема, нейродермит, розовые угри, вульгарные угри); *в гинекологии* (неспецифические воспалительные заболевания влагалища и шейки матки (кольпит, цервицит)); *в урологии* (хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, хронический простатит).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Применение препарата наружно и местно возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

Настой сбора применяют внутрь, наружно или местно (в том числе ингаляционно).

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, периодически надавливая на фильтр-пакеты ложкой. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Для приема внутрь используют по 1/3 стакана теплого настоя 3 раза в день за 30 мин до еды. *Наружно* холодный настой используют в неразбавленном виде для примочек 1-2 раза в сутки. *Для ингаляций* применяют настой в горячем (теплом) неразбавленном виде, в том числе при проведении процедур на ультразвуковом ингаляторе. *Для полосканий, орошений и спринцеваний* настой разбавляют в 2 раза. *Для микроклизм* используют по 50 мл неразбавленного теплого настоя.

Настой применяют: *при заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов* - одновременно внутрь и местно в виде полосканий и ингаляций 2-5 раз в сутки в течение 2-3 недель; *в стоматологии* - одновременно внутрь и местно в виде полосканий, орошений, примочек и для пропитывания турунд разбавленным в 2-4 раза теплым настоем 2-5 раз в сутки в течение 5-7 дней; *в гастроэнтерологии* - внутрь в течение 2-3 недель; *в дерматологии* - в течение 2-3 недель одновременно внутрь и наружно в виде примочек; *в гинекологии* - в течение 2-4 недель одновременно внутрь и местно 1-2 раза в сутки в виде спринцеваний,

орошений и примочек теплым разбавленным настоем; *в урологии* - внутрь и местно в виде микроклизм в течение 2-3 недель.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.
Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.
Не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Для проведения ингаляций (в том числе с использованием ультразвукового ингалятора) следует использовать только теплый или горячий настой (при использовании холодного настоя возможно развитие бронхоспазма!).
При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5-7 дней следует обратиться к врачу.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

ФОРМА ВЫПУСКА.
Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.
Полученный настой следует использовать свежеприготовленным.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.
2 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.
Отпускают без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.
ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье» Р.Р. Алиева

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Здоровье» ОГРН 5147746145730 * МОСКВА *

ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0000000006

135530