



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФЛАМАКС ФОРТЕ®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг

лекарственная форма, дозировка

РЕПЛЕК ФАРМ ООО Скопье, Республика Македония -


ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Беременность и лактация Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.	Применение при беременности и в период грудного вскармливания <u>Беременность</u> Применение препарата противопоказано во время беременности. Применение НПВП женщинами с 20-й недели беременности может привести к развитию маловодия и/или патологии почек у новорожденных (неонатальная почечная дисфункция). <u>Лактация</u> Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания



Начальник медицинского отдела
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»



ТИХОНОВА И.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 17-03/137 СТ 03.02.20

135392