

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Бом-Бенге

Регистрационный номер

Торговое название: Бом-Бенге

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г: ментол - 3,9 г, либо масло мяты перечной 7,8 г; метилсалицилат - 20,2 г.

Вспомогательные вещества: вазелин медицинский, парафины нефтяные твердые.

Описание. Мазь белого или желтого цвета с запахом ментола и метилсалицилата

Фармакотерапевтическая группа: местнораздражающее средство.

Код АТХ: M02AC

Фармакологические свойства. Обладает обезболивающим и противовоспалительным действием.

Показания к применению: артралгии, миалгии, болевой синдром при заболеваниях околосуставных тканей, люмбоишиалгия, радикулит.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, открытые раны, раздражение кожи, дети до 6 лет.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Беременность, грудное вскармливание, «аспириновая» бронхиальная астма, детский возраст от 6 до 12 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Необходимое количество мази (2-4 г, что соответствует объему крупной вишни) втирают в болезненные участки кожи. При необходимости процедуру повторяют через несколько часов (до 3 раз в день). Продолжительность курса (без консультации врача) до 10 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях развивается гиперчувствительность к препарату, раздражение в месте введения, кожные аллергические реакции, а также ангионевротический отек.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Передозировка ментола и метилсалицилата наблюдалась в отдельных случаях, главным образом у детей, при случайном приеме внутрь, препаратов, содержащих данные вещества.

Симптомы передозировки: возбуждение, увеличение глубины дыхания, гиперпирексия, тошнота, боль в животе, рвота и симптомы угнетения центральной нервной системы таких, как головокружение, неустойчивая походка, приливы к лицу, сонливость, угнетение дыхания и кома.

Лечение: симптоматическое и поддерживающее; коррекция электролитного и водного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела; в тяжелых случаях – переливание крови, гемодиализ.

Передозировка при местном применении происходит редко и только при неправильном использовании препарата (нанесение на слизистые оболочки, на обширные области поврежденной или инфицированной кожи).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, таким образом, совместное применение с другими препаратами локального действия может приводить к усилению их всасывания. Использование больших количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект гипогликемических средств. Препарат не использовать с пероральными антикоагулянтами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Только для наружного применения. Не применять с согревающими компрессами. При появлении раздражения кожи прекратить применение. Избегать попадания в глаза, на слизистые оболочки, на участки раздражения кожи. Не использовать препарат более 10 дней без консультации врача.

Форма выпуска

По 25 г в банках из стекломассы оранжевого стекла. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.

По 20 банок вместе с инструкциями по применению помещают в коробки из картона.

Условия хранения

В сухом, прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Срок годности

3 года. Не использовать позже срока указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек


Без рецепта врача

Предприятие – производитель

ОАО «Биохимик», 430030, Россия, г. Саранск, ул. Васенко, 15 А.

Факс (8342) 47-36-48, 47-36-78.

Директор ИДКЭЛС
профессор



Чельцов В.В.

Представитель предприятия:

A handwritten signature, likely belonging to V.D. Shelenkova, written in dark ink.

Шеленкова В.Д