

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Метионин

Регистрационный номер:

Торговое название: Метионин

Международное непатентованное название (МНН): Метионин (Methionine)

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав

Активное вещество: метионин 250 мг.

Вспомогательные вещества (ядро): крахмал картофельный – 13,99 мг, метилцеллюлоза – 2,36 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 60,35 мг, стеариновая кислота – 3,30 мг.

Вспомогательные вещества (оболочка пленочная): гипромеллоза – 5,367 мг, титана диоксид – 2,43 мг, краситель азорубин – 0,003 мг, полисорбат-80 – 1,20 мг, повидон (поливинилпирролидон) – 1,00 мг.

Описание

Таблетки круглые, двояковыпуклой формы, без риса, покрытые пленочной оболочкой розового или светло-розового цвета. На поперечном срезе видны два слоя – ядро белого или почти белого цвета и пленочная оболочка розового или светло-розового цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Метаболическое средство

Код АТХ

A05BA

Фармакодинамика

Оказывает метаболическое, гепатопротекторное действие. Метионин — незаменимая аминокислота — необходима для синтеза холина, с дефицитом которого связано нарушение синтеза фосфолипидов из жиров и отложение в печени нейтрального жира. Является донатором метильной группы.

Участвует в биосинтезе карнитина, цистеина, таурина, лецитина, фосфатидилхолина и других фосфолипидов. Нарушение биотрансформации метионина может привести к атеросклерозу.

Метионин является одной из важнейших аминокислот, необходимых для биосинтеза белка.

Необходим для дезинтоксикации некоторых ксенобиотиков.

Фармакокинетика

Легко всасывается из кишечника. С мочой выводится в небольшом количестве.

Показания к применению

В составе комплексной терапии: заболевания печени, протекающие с жировой инфильтрацией гепатоцитов — токсический гепатит, гепатоз (в т.ч. алкогольный), цирроз печени легкой и средней степени тяжести.

Профилактика токсических поражений печени мышьяком, хлороформом, бензолом.

В составе комбинированной терапии: дефицит белка различного происхождения.

Противопоказания

Вирусный гепатит, тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 лет.

С осторожностью

Почечная недостаточность (опасность нарастания гиперазотемии).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Исследований, подтверждающих безопасность метионина для плода при применении его в период беременности и безопасность для ребенка при применении в период грудного вскармливания, не проводилось.

Применение препарата при беременности и в период кормления грудью возможно только по назначению врача в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30–60 минут до еды.

Взрослым — по 500–1500 мг 1 раз в день.

Детям старше 6 лет по 250–500 мг 1 раз в день.

Курс лечения 10–30 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции, тошнота, рвота.

Передозировка

Симптомы: снижение артериального давления, тахикардия, спутанность сознания.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с лекарственными препаратами не описаны.

Применение метионина в сбалансированном соотношении с другими аминокислотами предупреждает его токсическое действие.

Особые указания

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Несбалансированное применение метионина в больших дозах может оказать повреждающее действие на клетки печени и других органов.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг.

По 10, 25 или 50 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток в контейнер полимерный для лекарственных средств.

Один контейнер или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «Озон»


Юридический адрес: 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11.

Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий):

445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11.

Тел./факс: (84862) 3-41-09.

Директор ООО «Озон»



Ю. Р. Корнев