МИНЗДРАВ РОССИИ
12.02.2024
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Метформин-Акрихин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, 1000 мг

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»), Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 12.02.2024 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: **При производстве в АО «АКРИХИН»** Одна таблетка (850 мг) содержит: *Действующее вещество:* метформина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество- 850 мг; *Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон (тип К90), стеариновая кислота, глицерол, кремния диоксид коллоидный. *Состав оболочки:* гипромеллоза-2910, макрогол-6000, тальк или готовая пленочная оболочка белого цвета [гипромеллоза - 82,00 %, макрогол-6000 - 10,00 %, тальк- 8,00 %]. Одна таблетка (1000 мг) содержит: *Действующее вещество:* метформина гид-	**Состав:** Одна таблетка (850 мг) содержит: *Действующее вещество:* метформина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество- 850 мг; *Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон (тип К90), стеариновая кислота, глицерол, кремния диоксид коллоидный. *Состав оболочки:* гипромеллоза-2910, макрогол-6000, тальк или готовая пленочная оболочка белого цвета [гипромеллоза - 82,00 %, макрогол-6000 - 10,00 %, тальк- 8,00 %]. Одна таблетка (1000 мг) содержит: *Действующее вещество:* метформина гид-

Старая редакция	Новая редакция
рохлорид в пересчете на 100 % вещество - 1000 мг; *Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон (тип К90), стеариновая кислота, глицерол, кремния диоксид коллоидный. *Состав оболочки:* гипромеллоза-2910, макрогол-6000, тальк или готовая пленочная оболочка белого цвета [гипромеллоза- 82,00 %, макрогол-6000-10,00 %, тальк- 8,00 %]. **При производстве в ООО НПО «Фарм-ВИЛАР»** Одна таблетка (850 мг) содержит: *Действующее вещество:* метформина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество - 850 мг; *Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон (тип К90), стеариновая кислота, глицерол, кремния диоксид коллоидный. *Состав оболочки:* гипромеллоза-2910, макрогол-6000, тальк или готовая смесь «Опадрай» белого цвета [гипромеллоза-82,00 %, макрогол-6000-10,00 %, тальк- 8,00 %], или готовая смесь «Вивакоут» [гипромеллоза- 82,00 %, макрогол-6000-10,00%, тальк-8,00 %]. Одна таблетка (1000 мг) содержит: *Действующее вещество:* Метформина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 1000 мг; *Вспомогательные вещества:* крахмал кар-	рохлорид в пересчете на 100 % вещество - 1000 мг; *Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон (тип К90), стеариновая кислота, глицерол, кремния диоксид коллоидный. *Состав оболочки:* гипромеллоза-2910, макрогол-6000, тальк или готовая пленочная оболочка белого цвета [гипромеллоза- 82,00 %, макрогол-6000-10,00 %, тальк- 8,00 %].

Старая редакция	Новая редакция
тофельный, повидон (тип К90), стеариновая кислота, глицерол, кремния диоксид коллоидный. *Состав оболочки:* гипромеллоза-2910, макрогол-6000, тальк или готовая смесь «Опадрай» белого цвета [гипромеллоза - 82,00 %, макрогол-6000-10,00 %, тальк - 8,00 %], или готовая смесь «Вивакоут» [гипромеллоза - 82,00 %, макрогол-6000- 10,00 %, тальк- 8,00 %]. **Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, 1000 мг. **<u>При упаковке в АО «АКРИХИН»</u>** По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 30 или 60 таблеток в банку для лекарственных средств из полипропилена или полиэтилена низкого давления, укупоренную крышкой навинчиваемой. Каждую банку, 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. **<u>При упаковке в ООО НПО «ФармВИЛАР»</u>** По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению по-	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, 1000 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 30 или 60 таблеток в банку для лекарственных средств из полипропилена или полиэтилена низкого давления, укупоренную крышкой навинчиваемой. Каждую банку, 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Старая редакция	Новая редакция
мещают в пачку из картона. **Производитель** Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, стр. 3, 4, 6. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «ФармВИЛАР» (ООО НПО «ФармВИЛАР»), Россия 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115	**Производитель** Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3, 4, 6.

Представитель фирмы И.В. Милованова