

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Физиотенз®

(наименование лекарственного препарата)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,2 мг, 0,4 мг
(лекарственная форма, дозировка)АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», Республика
КазахстанАО «ВЕРОФАРМ», Россия
(наименование производителя, страна)

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой с дозировкой 0,2 мг содержит: <u>Действующее вещество:</u> моксонидин 0,2 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> лактозы моногидрат – 95,80 мг, повидон K25 – 0,70 мг, кросповидон – 3,00 мг, магния стеарат – 0,30 мг. <u>Оболочка:</u> гипромеллоза – 1,30 мг, этилцеллюлозы водная дисперсия 30% – 4,0 мг (в пересчете на сухое вещество – 1,20 мг), макрогол – 0,25 мг, тальк – 0,9975 мг, краситель	Состав 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой с дозировкой 0,2 мг содержит: <u>Действующее вещество:</u> моксонидин 0,2 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> лактозы моногидрат – 95,80 мг, повидон K25 – 0,70 мг, кросповидон – 3,00 мг, магния стеарат – 0,30 мг. <u>Оболочка:</u> этилцеллюлозы водная дисперсия 30 %–4,0 мг (в пересчете на сухое вещество – 1,20 мг), смесь для покрытия пленочной оболочкой розового цвета [гипромеллоза – 1,30

Старая редакция	Новая редакция
железа оксид красный (Е 172) – 0,0025 мг, титана диоксид (Е 171) – 1,25 мг.	мг, макрогол – 0,25 мг, тальк – 0,9975 мг, краситель железа оксид красный (Е 172) – 0,0025 мг, титана диоксид (Е 171) – 1,25 мг)].
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой с дозировкой 0,4 мг содержит:	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой с дозировкой 0,4 мг содержит:
<u>Действующее вещество:</u> моксонидин 0,4 мг.	<u>Действующее вещество:</u> моксонидин 0,4 мг.
<u>Вспомогательные вещества:</u> лактозы моногидрат – 95,60 мг, повидон К25 – 0,70 мг, кросповидон – 3,00 мг, магния стеарат – 0,30 мг.	<u>Вспомогательные вещества:</u> лактозы моногидрат – 95,60 мг, повидон К25 – 0,70 мг, кросповидон – 3,00 мг, магния стеарат – 0,30 мг.
<u>Оболочка:</u> гипромеллоза – 1,30 мг, этилцеллюлозы водная дисперсия 30 % – 4,0 мг (в пересчете на сухое вещество – 1,20 мг), макрогол – 0,25 мг, тальк – 0,875 мг, краситель железа оксид красный (Е 172) – 0,125 мг, титана диоксид (Е 171) – 1,25 мг.	<u>Оболочка:</u> этилцеллюлозы водная дисперсия 30 % – 4,0 мг (в пересчете на сухое вещество – 1,20 мг), смесь для покрытия пленочной оболочкой розового цвета [гипромеллоза – 1,30 мг, макрогол – 0,25 мг, тальк – 0,875 мг, краситель железа оксид красный (Е 172) – 0,125 мг, титана диоксид (Е 171) – 1,25 мг].

Специалист по регистрации
ООО «Эбботт Лэбораториз»



Титова И.Н.