

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГИДРОПЕРИТ

Номер регистрационного удостоверения: ЛС-001662

Торговое наименование лекарственного препарата: Гидроперит

Международное непатентованное или группировочное наименование: мочевины пероксид

Лекарственная форма: таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения

Состав

1 таблетка содержит:

Действующее вещество: мочевины пероксид (гидроперит) – 1,5 г.

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета со слегка заметными прозрачными вкраплениями, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство

Код АТХ: D02AE

Фармакологические свойства

Гидроперит относится к группе антисептических средств-окислителей и представляет собой комплексное соединение водорода пероксида с мочевиной. При взаимодействии гидроперита с такими ферментами организма, как каталаза и пероксидаза, выделяется кислород, проявляющий гемостатическое и антимикробное действие, поэтому после разведения препарат может применяться вместо готового раствора перекиси водорода. При его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов, поэтому как средство стерилизации препарат использовать нецелесообразно.

Показания к применению

Гидроперит в виде водного раствора применяют для промываний и полосканий при стоматитах, тонзиллитах, гинекологических заболеваниях; при капиллярных кровотечениях из поверхностных ран, носовых кровотечениях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Способ применения и дозы

Гидроперит применяют в виде водного раствора.

Для полоскания полости рта и горла растворяют 1 таблетку в стакане воды (0,25 % раствор перекиси водорода). Для промывания растворяют 4 таблетки в стакане воды (1 % раствор перекиси водорода). Одна таблетка соответствует 15 мл 3 % раствора перекиси водорода.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

- Ощущение жжения в момент обработки раны;
- аллергические реакции;
- гипертрофия сосочков языка (при длительном применении для полоскания полости рта).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов, оксидантов, на свету, в тепле.

Если Вы применяете вышеперечисленные средства перед применением препарата Гидроперит проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Антисептическое действие не является стерилизующим, происходит временное уменьшение количества микроорганизмов.

Не следует применять окклюзионные повязки.

Нельзя использовать для орошения полостей, следует избегать попадания в глаза.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения 1,5 г.

По 6 или 8 таблеток в контурную безъячейковую упаковку. 1, 2 контурные безъячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Контурные безъячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Адрес места производства/Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Татхимфармпрепараты», Россия,

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: (843) 571-85-58; факс: (843) 571-85-38

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Генеральный директор
АО «Татхимфармпрепараты»



Т.Ш. Ханнанов