

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
НЕОПРОКТ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: НЕОПРОКТ®

Международное непатентованное или группировочное наименование: натрия алгинат

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

действующее вещество: натрия алгинат – 250 мг;

вспомогательное вещество: жир твердый (Витепсол Н15).

Описание

Суппозитории от светло-серого до серого цвета с возможным желтоватым оттенком, торпедообразной формы. Допускается наличие беловатого налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа: гемостатическое средство для местного применения

Код АТХ: B02BC

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Действующее вещество препарата – натрия алгинат – природный полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей. Оказывает выраженное гемостатическое, противовоспалительное и репаративное действие.

Фармакокинетика

Не описана.

Показания к применению

Хронические анальные трещины в стадии эпителизации, хронический кровоточащий геморрой, проктосигмоидит и воспалительные явления в прямой кишке в послеоперационном периоде.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 14 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат Неопрокт® не противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Ректально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.

Суппозиторий вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы.

Взрослым и детям старше 14 лет – по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.

Длительность курса лечения препаратом Неопрокт® составляет 7–14 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых лекарственных взаимодействий отмечено не было.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами, работе с механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные, 250 мг.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «ФП «Оболенское», Российская Федерация

142279, Российская Федерация, обл. Московская, р-н Серпуховский, рп. Оболенск,
промзона район рп Оболенск, стр. 78

Тел./факс: +7 (495) 646-28-68. www.obolensk.ru

Производитель


ООО «Альтфарм», Россия

142073, Московская обл., г. Домодедово, д. Судаково, территория вл. Лесное, стр. 10б.

Директор по регуляторике и исследованиям



Г. У. Сетдекова



127874