

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ

**Регистрационный номер:** ЛП-000641

**Торговое наименование:** Натрия тетраборат

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** натрия тетраборат

**Лекарственная форма:** раствор для местного и наружного применения

**Состав на 1 г**

*Действующее вещество:*

Натрия тетраборат - 200 мг

*Вспомогательные вещества:*

Глицерол (глицерин) - 728 мг

Вода очищенная - 72 мг

**Описание:** бесцветная прозрачная или слегка опалесцирующая вязкая жидкость

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство

**Код АТХ:** D08AD

**Фармакологические свойства***Фармакодинамика*

Антисептическое средство. Обладает бактериостатической активностью. Эффективен при кандидозе. Удаляет мицелий гриба со слизистых оболочек, нарушает процесс прикрепления гриба к слизистым оболочкам и тормозит его размножение (не является противогрибковым препаратом, т.к. не обладает фунгицидным или фунгистатическим действием).

*Фармакокинетика*

Системная абсорбция при местном и наружном применении низкая; всасывается в желудочно-кишечном тракте при частичном проглатывании (при смазывании слизистой оболочки полости рта, глотки), может всасываться через поврежденные кожные покровы. Депонируется в костной ткани и печени. Выводится почками в неизмененном виде и через кишечник в течение одной недели.

### **Показания к применению**

Кандидозные поражения слизистой оболочки полости рта, глотки, половых органов; опрелости, пролежни.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату; нарушение целостности слизистой оболочки и кожи; беременность; период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Местно и наружно. Возрастная категория пациентов: взрослые.

Наружно: для смазывания кожи 2 - 3 раза в день.

Местно.

*Кандидоз слизистой оболочки полости рта, глотки:* смазывают пораженные участки слизистой оболочки 2 - 3 раза в день. Курс лечения составляет 3 - 7 дней.

*Вагинальный кандидоз (молочница):* перед применением препарата необходимо провести спринцевание кипяченой водой или настоем цветков ромашки аптечной. Затем ватный тампон смочить в растворе натрия тетрабората и ввести во влагалище на 20 - 30 минут. При незначительных выделениях и зуде препарат применяют 1 раз в день (на ночь), а при обильных выделениях 2 раза в день (утром и на ночь). Курс лечения составляет 5 - 7 дней.

*Опрелости, пролежни:* смазывать пораженные участки кожи 2 - 3 раза в день. Продолжительность курса лечения - в зависимости от степени и площади поражения.

*Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.*

*Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

### **Побочное действие**

Аллергические реакции; гиперемия и чувство жжения в месте нанесения или введения препарата.

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

### **Передозировка**

Симптомы при случайном приеме внутрь (смертельная доза для взрослых – 10 - 20 г, токсическая концентрация в крови – 40 мг/л, смертельная – 50 мг/л): боль в животе, рвота, снижение аппетита, диарея, дегидратация, слабость, спутанность сознания, дерматиты, нарушение менструального цикла, анемия, подергивание мышц лица и конечностей, аллопеция, нарушение функции сердца, печени и/или почек.

Лечение: промывание желудка, форсированный диурез, при тяжелом отравлении – гемодиализ, в/м – рибофлавин-моноклеотид 10 мг/сут, коррекция водно-электролитного баланса и ацидоза: в/в инфузия раствора натрия гидрокарбоната, плазмозамещающие растворы, раствор натрия хлорида и декстрозы. При болях в животе – п/к 1 мл 0,1 % раствора атропина, 1 мл 0,2 % раствора платифиллина, 1 мл 1 % раствора промедола, в/в – декстрозо-прокаиновая смесь (50 мл 2 % раствора прокаина и 5 мл 5 % раствора декстрозы).

Поддержание функций сердечно-сосудистой системы.

Сведения о симптомах передозировки при местном и наружном применении препарата отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

При монотерапии вагинального кандидоза с целью повышения эффективности необходимо, чтобы лечебные процедуры проводились медицинским персоналом, многократно; в противном случае мицелий гриба может задерживаться в криптах слизистой оболочки влагалища, что приведет к рецидиву заболевания.

Внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как начать применение препарата.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и др.).

### **Форма выпуска**

Раствор для местного и наружного применения, 20 %.

По 30 г во флаконах темного стекла с винтовой горловиной, укупоренных пробками полимерными из полиэтилена высокого давления и крышками полимерными навинчиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления, или из смеси полиэтиленов.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии**

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д.1

тел. +7 (495) 956-05-71; [www.mosfarma.ru](http://www.mosfarma.ru)

Начальник отдела регистрации

ЗАО «Московская

фармацевтическая фабрика»



Н.А. Шишкин