

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТАСиалор[®] рино,

капли назальные, 0,01 %, 0,025 %, 0,05 %

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», РФ

Изменение № 3

150921

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению • Лечение острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком; • аллергический ринит; • вазомоторный ринит; • для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа, евстахиите, среднем отите; • для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах. Противопоказания Атрофический ринит; закрытоугольная глаукома; гиперчувствительность к компонентам препарата. Следует придерживаться рекомендуемых концентраций препарата, предназначенных для разных возрастных категорий (смотри раздел «Способ применения и дозы»).	Показания к применению • Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка); • острый аллергический ринит; • обострение вазомоторного ринита; • для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа (синуситах), евстахиите, среднем отите; • для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах. Противопоказания • Гиперчувствительность к оксиметазолину и другим компонентам препарата; • атрофический ринит; • закрытоугольная глаукома; • хирургические вмешательства на

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Интраназально. <u>Взрослые и дети старше 6 лет:</u> применять по 1-2 капли 0,05 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. <u>Дети от 1 года до 6 лет:</u> применять по 1-2 капли 0,025 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. <u>Дети до 1 года:</u> детям в возрасте до 4 недель назначают по 1 капле 0,01 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. С 5-ой недели жизни и до 1 года – по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в день. Не рекомендуется применять препарат более 7 дней. При частом и длительном использовании препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. При появлении этих симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу.	твёрдой мозговой оболочке (в анамнезе); • состояние после трансфеноидальной гипофизэктомии; • воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа; • детский возраст до 1 года – для 0,025 % раствора; • детский возраст до 6 лет – для 0,05 % раствора. Способ применения и дозы Интраназально. <i>Взрослые и дети старше 6 лет:</i> по 1-2 капли 0,05 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. <i>Дети в возрасте от 1 года до 6 лет:</i> по 1-2 капли 0,025 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. <i>Дети в возрасте до 1 года:</i> в возрасте до 4 недель – по 1 капле 0,01 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день, с 5-ой недели до 1 года – по 1-2 капли 0,01 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. Доказана эффективность также следующей процедуры: в зависимости от возраста 1-2 капли 0,01 % раствора наносят на вату и протирают носовые ходы. Препарат применяется от 3 до 5 дней. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять препарат не более 7 дней. Если симптомы усиливаются или улучшения не наступает в течение 3 дней,

Старая редакция	Новая редакция
	необходимо проконсультироваться с врачом. Повторный курс препарата возможен только спустя несколько дней, в течение которых препарат не применялся. При частом и длительном применении препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. В этом случае следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

Руководитель департамента регистрации
АО «ПФК Обновление»



В.В. Нецко