МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-006587/09- 211221
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Антигриппин

Парацетамол + Хлорфенамин + [Аскорбиновая кислота]

порошок для приготовления раствора для приема внутрь медово-лимонный 500 мг + 10 мг + 200 мг,

порошок для приготовления раствора для приема внутрь ромашковый 500 мг + 10 мг + 200 мг,

порошок для приготовления раствора для приема внутрь лимонный 500 мг + 10 мг + 200 мг,

порошок для приготовления раствора для приема внутрь черносмородиновый 500 мг + 10 мг + 200 мг

ООО «Бауш Хелс», Россия

Изменение № 7

Дата внесения Изменения «____» 211221 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Антигриппин **Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь медово-лимонный и ромашковый	**Торговое наименование:** Антигриппин **Лекарственная форма:** Порошок для приготовления раствора для приема внутрь медово-лимонный, порошок для приготовления раствора для приема внутрь ромашковый, порошок для приготовления раствора для приема внутрь лимонный, порошок для приготовления раствора для

Старая редакция	Новая редакция
Состав на один пакетик: *Активные вещества:* парацетамол - 500,00 мг хлорфенамина малеат - 10,00 мг аскорбиновая кислота - 200,00 мг *Вспомогательные вещества:* *Медово-лимонный:* натрия гидрокарбонат 644,00 мг, лимонная кислота 1328,00 мг, сорбитол 317,00 мг, повидон 16,00 мг, сахароза 1793,00 мг, натрия цикламат 42,00 мг, аспартам 20,00 мг, ацесульфам калия 15,00 мг, ароматизатор лимонный 55,00 мг, краситель карамельный 15,00 мг, ароматизатор медовый 45,00 мг. *Ромашковый:* натрия гидрокарбонат 644,00 мг, лимонная кислота 928,00 мг, сорбитол 317,00 мг, повидон 16,00 мг, сахароза 2058,00 мг, натрия цикламат 42,00 мг, аспартам 20,00 мг, ацесульфам калия 15,00 мг, экстракт ромашки 250,00 мг.	приема внутрь черносмородиновый. **Состав на один пакетик медово-лимонный:** *Действующие вещества:* парацетамол - 500,00 мг хлорфенамина малеат - 10,00 мг аскорбиновая кислота - 200,00 мг *Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, повидон К30, сахароза, натрия цикламат, аспартам, ацесульфам калия, ароматизатор лимонный, краситель карамельный, ароматизатор медовый. **Состав на один пакетик ромашковый:** *Действующие вещества:* парацетамол - 500,00 мг хлорфенамина малеат - 10,00 мг аскорбиновая кислота - 200,00 мг *Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, повидон К30, сахароза, натрия цикламат, аспартам, ацесульфам калия, экстракт ромашки. **Состав на один пакетик лимонный:** *Действующие вещества:*

Старая редакция	Новая редакция
	парацетамол - 500,00 мг хлорфенамина малеат - 10,00 мг аскорбиновая кислота - 200,00 мг *Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, повидон К30, сахароза, натрия цикламат, аспартам, ацесульфам калия, магния цитрат, рибофлавина фосфат натрия, ароматизатор лимонный. **Состав на один пакетик черносмородиновый:** *Действующие вещества:* парацетамол - 500,00 мг хлорфенамина малеат - 10,00 мг аскорбиновая кислота - 200,00 мг *Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, повидон К30, сахароза, натрия цикламат, аспартам, ацесульфам калия, магния цитрат, краситель вишнево-красный, ароматизатор черносмородиновый.
Описание: *Порошок медово-лимонный:* порошок разной степени грануляции, состоящий из частиц от белого до серовато-	**Описание:** *Порошок медово-лимонный:* порошок разной степени грануляции, состоящий из частиц от белого до серовато-

Старая редакция	Новая редакция
бежевого цвета, со специфическим запахом. Допускаются вкрапления темно-бурого цвета. *Порошок ромашковый:* порошок разной степени грануляции, состоящий из частиц от белого до бежевого и светло-коричневого цвета, со специфическим запахом. Допускаются вкрапления бурого цвета.	бежевого цвета, с характерным запахом. Допускаются вкрапления темно-бурого цвета. *Порошок ромашковый:* порошок разной степени грануляции, состоящий из частиц от белого до бежевого и светло-коричневого цвета, с характерным запахом. Допускаются вкрапления бурого цвета. *Порошок лимонный:* порошок, состоящий из гранул разного размера от белого до белого с желтоватым или коричневатым оттенком цвета, без комочков, с лимонным запахом. *Порошок черносмородиновый:* порошок, состоящий из гранул разного размера светло-фиолетового с сероватым оттенком цвета, допускаются вкрапления более темного цвета, без комочков, с запахом черной смородины.
Особые указания: При приеме метоклопрамида, домперидона или колестирамина также необходимо проконсультироваться с врачом. При длительном применении в дозах,	**Особые указания:** При приеме метоклопрамида, домперидона или колестирамина также необходимо проконсультироваться с врачом. При длительном применении в дозах,

Старая редакция	Новая редакция
значительно превышающих рекомендованные, повышается вероятность нарушения функции печени и почек, необходим контроль периферической картины крови. Парацетамол и аскорбиновая кислота могут искажать показатели лабораторных исследований (количественное определение содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови, билирубина, активности "печеночных" трансаминаз, ЛДГ). Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя. Риск развития повреждений печени возрастает у больных с алкогольным гепатозом. Назначение аскорбиновой кислоты пациентам с быстро пролиферирующими и интенсивно метастазирующими опухолями может усугубить течение процесса. У пациентов с повышенным	значительно превышающих рекомендованные, повышается вероятность нарушения функции печени и почек, необходим контроль периферической картины крови. Парацетамол и аскорбиновая кислота могут искажать показатели лабораторных исследований (количественное определение содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови, билирубина, активности "печеночных" трансаминаз, ЛДГ). Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя. Риск развития повреждений печени возрастает у больных с алкогольным гепатозом. Назначение аскорбиновой кислоты пациентам с быстро пролиферирующими и интенсивно метастазирующими опухолями может усугубить течение процесса. У пациентов с повышенным

Старая редакция	Новая редакция
содержанием железа в организме следует применять аскорбиновую кислоту в минимальных дозах. В одном пакетике медово-лимонном содержится 1,793 г. сахара, что соответствует 0,15 ХЕ. В одном пакетике ромашковом содержится 2,058 г. сахара, что соответствует 0,17 ХЕ.	содержанием железа в организме следует применять аскорбиновую кислоту в минимальных дозах. В одном пакетике медово-лимонном и лимонном содержится 1,793 г и 1,738 г сахара, соответственно, что соответствует около 0,15 ХЕ. В одном пакетике ромашковом и черносмородиновом содержится 2,058 г и 1,993 г сахара, соответственно, что соответствует около 0,17 ХЕ.
Форма выпуска: Порошок для приготовления раствора для приема внутрь медово-лимонный и ромашковый. По 5,0 г порошка в пакетике из бумаги/Al/полиэтилена. По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 30 пакетиков в картонной пачке с инструкцией по применению.	**Форма выпуска:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь медово-лимонный 500 мг + 10 мг + 200 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь ромашковый 500 мг + 10 мг + 200 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь лимонный 500 мг + 10 мг + 200 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь черносмородиновый 500 мг + 10 мг + 200 мг. По 5,0 г порошка в пакетике из

Старая редакция	Новая редакция
	ПЭТ/Ал/ПЭ. По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 30 пакетиков в картонной пачке с инструкцией по применению.

Директор департамента по регистрации
по России и странам СНГ ООО «Бауш Хелс» Т.В. Козлова