

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Цинка бисвинилимидазола диацетат

наименование лекарственного препарата

раствор внутримышечного введения, 60 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Федеральное государственное унитарное предприятие

Научно-производственный центр «Фармзащита»

Федерального медико-биологического агентства

(ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России)

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 090222 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЦИНКА БИСВИНИЛИМИДАЗОЛА ДИАЦЕТАТ	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЦИНКАЗОЛ®
Торговое наименование: Цинка бисвинилимидазола диацетат	Торговое наименование: ЦИНКАЗОЛ®
Способ применения и дозы Внутримышечно. Профилактика 1 мл препарата Цинка бисвинилимидазола диацетат вводят при угрозе отравления за 20-30 минут до предполагаемого воздействия –	Способ применения и дозы Внутримышечно. Профилактика 1 мл препарата ЦИНКАЗОЛ® вводят при угрозе отравления за 20-30 минут до предполагаемого воздействия – вхождения в зону

Старая редакция	Новая редакция
вхождения в зону задымления/загазованности, при высоком риске ингаляции углерода (II) в период проведения работ по ликвидации последствий аварий и катастроф, сопровождающихся пожарами, или при тушении самих пожаров и спасении пострадавших. Защитное действие препарата сохраняется в течение 1,5 – 2 часов. Повторное применение препарата Цинка бисвинилимидазола диацетат допускается через 1 час после первого введения. <i>Лечение</i> В качестве лечебного средства препарат Цинка бисвинилимидазола диацетат рекомендуется применять при отравлении оксидом углерода (II) в наиболее ранние сроки, вне зависимости от тяжести поражения. 1 мл препарата вводят сразу после извлечения пострадавшего из зоны пожара/загазованного помещения. Через 1 час допускается повторное введение. В последующем – по 1 мл 2 – 4 раза в сутки. Максимальная суточная доза для взрослого человека – 240 мг (4 мл). Курс лечения в среднем составляет 7 – 10 дней.	задымления/загазованности, при высоком риске ингаляции углерода (II) в период проведения работ по ликвидации последствий аварий и катастроф, сопровождающихся пожарами, или при тушении самих пожаров и спасении пострадавших. Защитное действие препарата сохраняется в течение 1,5 – 2 часов. Повторное применение препарата ЦИНКАЗОЛ[®] допускается через 1 час после первого введения. <i>Лечение</i> В качестве лечебного средства препарат ЦИНКАЗОЛ[®] рекомендуется применять при отравлении оксидом углерода (II) в наиболее ранние сроки, вне зависимости от тяжести поражения. 1 мл препарата ЦИНКАЗОЛ[®] вводят сразу после извлечения пострадавшего из зоны пожара/загазованного помещения. Через 1 час допускается повторное введение. В последующем – по 1 мл 2 – 4 раза в сутки. Максимальная суточная доза для взрослого человека – 240 мг (4 мл). Курс лечения в среднем составляет 7 – 10 дней.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами Не рекомендуется применять препарат Цинка бисвинилимидазола диацетат совместно с димеркаптопропансульфонатом натрия. При совместном применении с	Взаимодействие с другими лекарственными средствами Не рекомендуется применять препарат ЦИНКАЗОЛ[®] совместно с димеркаптопропансульфонатом натрия. При совместном применении с другими лекарственными средствами

Старая редакция	Новая редакция
другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не отмечено.	отрицательных эффектов не отмечено.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат Цинка бисвинилимидазола диацетат не оказывает неблагоприятного влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.	Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат ЦИНКАЗОЛ® не оказывает неблагоприятного влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Главный специалист отдела регистрации
лекарственных средств
ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России



С.А. Осокина