

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦИНКОВАЯ МАЗЬ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит для Вас информацию.

- *Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Цинковая мазь

Международное непатентованное или группировочное наименование: цинка оксид

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав

100 г мази содержат:

Действующее вещество:

Цинка оксид - 10,0 г

Вспомогательное вещество:

Вазелин медицинский - 90,0 г

Описание

Однородная масса от почти белого до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: препараты со смягчающим и защитным действием; препараты цинка.

Код АТХ: D02AB

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Цинковая мазь оказывает подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие. Симптоматический и защитный эффект препарата определяется цинка оксидом. Образует альбуминаты и денатурирует белки. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает явления экссудации, воспаления и раздражения тканей, образует защитный барьер от действия раздражающих факторов.

Помогает предупредить появление «пеленочной» сыпи при применении у детей грудного возраста, защищает от действия мочи и других раздражающих веществ и смягчает раздраженную кожу.

Показания к применению

Цинковая мазь показана к применению у взрослых и детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Лечение и профилактика «пеленочной» сыпи у новорожденных и младенцев.

В качестве средства первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины, опрелости).

Фотоконтактный дерматит.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения.

«Пеленочная» сыпь у новорожденных и младенцев

Вымыть и высушить пораженную область. Нанести мазь тонким слоем на пораженные участки кожи 2–3 раза в день. Курс лечения - до 1 мес. Количество наносимой мази зависит от обширности очага поражения.

Для профилактики «пеленочной» сыпи мазь наносят на кожу, покрываемую пеленкой или подгузниками, до начала появления признаков раздражения, особенно перед сном, когда ребенок может долгое время находиться в длительном контакте с мокрым бельем.

Порезы, царапины и ожоги

Наносят тонким слоем, при необходимости накладывают марлевую повязку.

Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения.

Фотоконтактный дерматит

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 4–6 раз в день, предварительно обработав трещины и корочки антисептическим раствором.

Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Классификация частоты возникновения нежелательных реакций: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1\,000$, но $< 1/100$); редко ($\geq 1/10\,000$, но $< 1/1\,000$); очень редко ($< 1/10\,000$); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Частота неизвестна: аллергические реакции (зуд, гиперемия, сыпь в местах нанесения

мази).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сведения отсутствуют.

Особые указания

Мазь предназначена только для наружного применения, не допускать попадания мази в глаза.

Мазь не следует наносить при наличии инфекции на местах поврежденной кожи.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Цинковая мазь не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 10 %.

По 30 г в тубы алюминиевые или в тубы полимерные из полиэтилена высокого и низкого давления или их смесей.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ПАО «Биосинтез», Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Дружбы, стр. 4

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя

ПАО «Биосинтез», Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Дружбы, стр. 4,
телефон/факс: (8412) 96-96-27.