

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Эстифан®

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки 200 мг

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 24 08 11 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<i>Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.</i> <i>Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.</i> <i>Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.</i> <i>Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.</i>	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЭСТИФАН® торговое наименование лекарственного препарата (Estifan®) <i>Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.</i>

Старая редакция	Новая редакция
• Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило через 5-7 дней.	Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭСТИФАН® (Estifan®)	• Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь. • Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. • Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось, или улучшение не наступило через 5-7 дней.
Состав на одну таблетку <i>Активного компонента</i> Эхинацеи экстракта сухого – 0,2 г с содержанием суммы производных оксикоричных кислот в пересчете на цикориевую кислоту 7 % <i>Вспомогательных веществ</i> – доста- [сахар молочный (лактозы точное моногидрат), крахмал коли- картофельный, чество поливинилпирролидон до по- низкомолекулярный лучения	Состав на одну таблетку <i>Активного компонента</i> Эхинацеи экстракта – 0,2 г сухого с содержанием суммы производных оксикоричных кислот в пересчете на цикориевую кислоту 7 % <i>Вспомогательных веществ</i> Сахара молочного – 0,190 г (лактозы моногидрат) Крахмала картофельного – 0,100 г Поливинилпирролидона – 0,005 г низкомолекулярного.

Старая редакция	Новая редакция
медицинский (повидон), таблетки кальция стеарат] массой 0,5 г	медицинского (повидон) Кальция стеарата – 0,005 г <i>Масса таблетки</i> – 0,5 г
Условия отпуска Отпускают без рецепта.	Условия отпуска из аптек Без рецепта.

Генеральный директор
ЗАО «ВИФИТЕХ»



С.А. Постельников
ФИО