

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
АММИАК + ГЛИЦЕРОЛ + ЭТАНОЛ**

Внимательно прочитайте инструкцию по применению препарата перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: АММИАК + ГЛИЦЕРОЛ + ЭТАНОЛ.

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Аммиак+Глицерол+Этанол.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой.

Состав на 100 мл: действующие вещества: аммиака раствор 10 % - 25 мл; глицерол - 25 г; этанол 95 % - 25 мл; *вспомогательное вещество:* вода очищенная - до 100 мл.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с запахом аммиака.

Фармакотерапевтическая группа: Дерматопротекторное средство.

Код АТХ: D08AX.

Фармакологические свойства

Антисептическое, дерматопротекторное средство, действие которого обусловлено активными веществами, входящими в состав препарата. Смягчает кожу рук.

Показания к применению

Сухость кожи рук.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи (в т.ч. дерматит, экзема) и другие заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применяют в случае, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят на чистую и высушенную кожу рук 2-3 раза в день. Лечение осуществляется по мере необходимости, до устранения симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции (покраснение, высыпания на коже, зуд). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании следует промыть обильно водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой.

По 80 и 100 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными, или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и, или крышками полимерными навинчиваемыми, или типа «Топаз», укупоренные пробками с уплотнительным элементом, или в банки оранжевого стекла, или во флаконы, укупоренные крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми.

По 80 и 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокого давления нестабилизированного и неокрашенного, или из полиэтилена низкого давления, или из полиэтилентерефталата, или во флаконы полимерные из полиэтилена высокого давления, или из полиэтилена низкого давления, или из полипропилена, или во флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами полимерными и крышками полимерными, или

укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с пробками, или укупоренные крышками полимерными.

Каждый флакон, банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается укладка флаконов, банок в групповую упаковку (коробку картонную) по 30, 32, 40, 50 штук с равным количеством инструкций по применению (для стационаров).

На флаконы, банки, групповую упаковку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Адрес места производства

Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70;

Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б;

Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», здание № 2.