МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-001943- 210521
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Артикаин с адреналином

наименование лекарственного препарата

раствор для инъекций (40 мг + 0,005 мг)/мл

лекарственная форма, дозировка

ФКП «Армавирская биофабрика», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 210521 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Гиперчувствительность к артикаину или к другим местноанестезирующим средствам амидного типа, за исключением случаев, когда при гиперчувствительности к местноанестезирующим средствам амидного типа аллергия к артикаину была исключена с помощью соответствующих исследований, проведенных с соблюдением всех необходимых правил и требований. Гиперчувствительность к эпинефрину; гиперчувствительность к любому из вспомогательных компонентов препарата. ***Противопоказания, относящиеся к артикаину*** Тяжелые нарушения функции синусового узла или тяжелые нарушения проводимости (такие, как тяжелая брадикардия, атриовентрикулярная блокада II-III степени). Острая декомпенсированная сердечная недостаточность. Тяжелая артериальная гипотензия. Анемия (в том числе B_{12}-дефицитная анемия). Метгемоглобинемия.	**Противопоказания** Гиперчувствительность к артикаину или к другим местноанестезирующим средствам амидного типа, за исключением случаев, когда при гиперчувствительности к местноанестезирующим средствам амидного типа аллергия к артикаину была исключена с помощью соответствующих исследований, проведенных с соблюдением всех необходимых правил и требований. Гиперчувствительность к эпинефрину; гиперчувствительность к любому из вспомогательных компонентов препарата. Детский возраст до 4 лет (отсутствие достаточного клинического опыта). ***Противопоказания, относящиеся к артикаину*** Тяжелые нарушения функции синусового узла или тяжелые нарушения проводимости (такие, как тяжелая брадикардия, атриовентрикулярная блокада II-III степени). Острая декомпенсированная сердечная недостаточность. Тяжелая артериальная гипотензия. Анемия (в том числе B_{12}-дефицитная ане-

Старая редакция	Новая редакция
Гипоксия. ***Противопоказания, относящиеся к эпинефрину*** Пароксизмальная тахикардия, тахиаритмия, закрытоугольная глаукома. Прием неселективных β-адреноблокаторов, например, пропранолола (риск развития гипертонического криза и тяжелой брадикардии). Гипертиреоз. Феохромоцитома. Тяжелая артериальная гипертензия. Терминальная анестезия. Недавно перенесенный инфаркт миокарда (до 6 месяцев), недавно перенесенное коронарное шунтирование (до 3 месяцев). Одновременное применение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО).	мия). Метгемоглобинемия. Гипоксия. ***Противопоказания, относящиеся к эпинефрину*** Пароксизмальная тахикардия, тахиаритмия, закрытоугольная глаукома. Прием неселективных β-адреноблокаторов, например, пропранолола (риск развития гипертонического криза и тяжелой брадикардии). Гипертиреоз. Феохромоцитома. Тяжелая артериальная гипертензия. Терминальная анестезия. Недавно перенесенный инфаркт миокарда (до 6 месяцев), недавно перенесенное коронарное шунтирование (до 3 месяцев). Одновременное применение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО).

Медицинский директор
ЗАО «Бинергия» Ханина Н.Ю.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * "Бинергия" ОГРН 1075001003175 * г. БАЛАШИХА *