МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-001943- 110222
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Артикаин с адреналином
наименование лекарственного препарата

раствор для инъекций (40 мг + 0,005 мг)/мл
лекарственная форма, дозировка

ФКП «Армавирская биофабрика», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 110222 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Гиперчувствительность к артикаину или к другим местноанестезирующим средствам амидного типа, за исключением случаев, когда при гиперчувствительности к местноанестезирующим средствам амидного типа аллергия к артикаину была исключена с помощью соответствующих исследований, проведенных с соблюдением всех необходимых правил и требований. Гиперчувствительность к эпинефрину; гиперчувствительность к любому из вспомогательных компонентов препарата. Детский возраст до 4 лет (отсутствие достаточного клинического опыта). ***Противопоказания, относящиеся к артикаину*** Тяжелые нарушения функции синусового узла или тяжелые нарушения проводимости (такие, как тяжелая брадикардия, атриовентрикулярная блокада II-III степени). Острая декомпенсированная сердечная недостаточность. Тяжелая артериальная гипотензия. Анемия (в том числе B_{12}-дефицитная анемия). Метгемоглобинемия.	**Противопоказания** - Повышенная чувствительность к артикаину или к другим местноанестезирующим средствам амидного типа, за исключением случаев, когда при гиперчувствительности к местноанестезирующим средствам амидного типа аллергия к артикаину была исключена с помощью соответствующих исследований, проведенным с соблюдением всех необходимых правил и требований. - Повышенная чувствительность к эпинефрину. - Повышенная чувствительность к сульфитам (в частности, у пациентов с бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к сульфитам, так как возможно развитие острых аллергических реакций, таких как бронхоспазм) и к любым другим вспомогательным компонентам препарата. ***Противопоказания, относящиеся к артикаину*** - Тяжелые нарушения функции синусового узла или тяжелые нарушения проводимости (такие как выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада 2-й или 3-й степени).

Старая редакция	Новая редакция
Гипоксия. ***Противопоказания, относящиеся к эпинефрину*** Пароксизмальная тахикардия, тахиаритмия, закрытоугольная глаукома. Прием неселективных β-адреноблокаторов, например, пропранолола (риск развития гипертонического криза и тяжелой брадикардии). Гипертиреоз. Феохромоцитома. Тяжелая артериальная гипертензия. Терминальная анестезия. Недавно перенесенный инфаркт миокарда (до 6 месяцев), недавно перенесенное коронарное шунтирование (до 3 месяцев). Одновременное применение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО).	- Острая декомпенсированная сердечная недостаточность. - Тяжелая артериальная гипотензия. - Детский возраст до 4 лет (отсутствие достаточного клинического опыта). ***Противопоказания, относящиеся к эпинефрину*** - Пароксизмальная тахикардия, тахиаритмия. - Недавно перенесенный (3-6 месяцев назад) инфаркт миокарда. - Недавно проведенное (3 месяца назад) аортокоронарное шунтирование. - Одновременный прием некардиоселективных бета-адреноблокаторов, например, пропранолола (риск развития гипертонического криза и тяжелой брадикардии). - Закрытоугольная глаукома. - Гипертиреоз. - Феохромоцитома. - Тяжелая артериальная гипертензия.

Медицинский директор
АО «Бинергия» Ханина Н.Ю.