

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ХОФИТОЛ
СНОРНУТОЛ

Регистрационный номер:

Торговое название: ХОФИТОЛ
СНОРНУТОЛ

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав (на 1 таблетку)

Активный компонент:

Артишока полевого (*Cynara scolymus* L.)

листьев экстракт сухой (водный)200 мг (0,20 г)

Вспомогательные вещества:

Магния трисиликат, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат.

Состав оболочки:

Гуммилак, канифоль, тальк, желатин, акации камедь, сахароза, карбонат кальция, краситель дисперсный*, карнаубский воск, полисорбат 80.

*Состав красителя дисперсного** - сахароза, оксиды железа, желтого, черного и коричневого (Е 172), метилпарагидроксибензоат (Е 218) и этилпарагидроксибензоат (Е 214).

Описание

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Желчегонное средство растительного происхождения.

Код АТХ: А05АХ

Фармакологические свойства

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока полевого биологически активных веществ. Цинарин в сочетании с фенолокислотами обладает желчегонным, а также гепатопротективным действием. Аскорбиновая кислота, каротин, витамины В₁ и В₂, инулин способствуют нормализации обменных процессов.

Обладает также диуретическим действием и усиливает выведение мочевины.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов, хронических гепатитов, цирроза печени; хронического нефрита, хронической почечной недостаточности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчно-каменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей.

Детский возраст до 3 лет.

Применение в период беременности и кормления грудью

Применение Хофитола в период беременности и кормления грудью возможно только по назначению и под контролем врача.

Способ применения и дозы

Внутри взрослым по 2–3 таблетки 3 раза в день до еды.

Детям старше 3-х лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды.

Курс лечения – 2-3 недели.

Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

10 таблеток в блистере (ПВХ - алюминий), шесть блистеров помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

12 таблеток в блистере (ПВХ - алюминий), пять блистеров помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

По 60 и 180 таблеток в полипропиленовую тубу, закрытую полиэтиленовой крышкой, с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Произведено:

Лаборатории РОЗА - ФИТОФАРМА

68, rue Жан-Жак Руссо

75001 Париж, Франция

Все претензии по качеству препарата направлять:

РОССИЯ 123610 Москва,

Краснопресненская наб. 12

ЦМТ, «Международная-2», офис 742

тел.: (495) 258 20 06, факс (495) 258 20 07

И.о. директора ИДКЭЛС

Представитель фирмы



Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA

Direction interne Intern Department

68, rue Jean-Jacques Rousseau

75001 PARIS-FRANCE

С.В. Буданов

Л.В. Кривова